

LSV Körnermais früh / mittelfrüh 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Sortenempfehlung 2025

Frühe Sorten: Kuno # K 200; Amavit K 210; KWS Emporio K 210

Mittelfrühe Sorten: KWS Gustavius K 230; DKC 3438 # K 240; LG 32257 # K 240; P 8255 K 240; Plutor K 240; Wesley # K 240;

Cracker # K 250; ES Traveler # K 250 *; Glutexo # K 250; Volney K 250

vorläufig: DKC 3400; DKC 3323 # K 250

= Sorte mit Vorteilen für die Doppelnutzung Silomais / Körnermais

* = Standfestigkeit im Prüfzeitraum nicht immer ausreichend

LSV Körnermais 2022 - 2024, Anbaugesamt D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Kornertrag bei 86% TM dt/ha - relativ

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024						23-24	22-24	
		2	2	3	5	7						
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Tützpatz	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit (B)	K 210	94	101	103	100	95		100	88	100	100	99
RGT Exxon (B)	K 220	90	97	93	93	100		101	100	96	96	95
KWS Emporio (B)	K 210	102	90	98	109	104		107	107	104	99	100
Farmactos (B)	K 210	97	92	89	89	94		92	104	91	91	92
Chelsey	K 210		99	96	97	96		89	96	96	97	
RGT Alyxx Duo	K 220		106	97	93	88		94	104	93	97	
Amatino	K 190			91	95	92		93	107	92		
Aroldo	K 210			102	101	103		102	108	102		
LG 31230*	K 220			92	91	95		103	107	93		
LID 1015 C*	K 210			93	92	99		98	110	94		
P 7818*	K 220			106	92	107		94	95	102		
KWS Gustavius (B)	K 230	95	96	108	102	99		100	101	103	101	100
ES Traveler (B)	K 250	104	106	104	99	104				102	104	104
Glutexo* (B)	K 250	107	105	106	105	105				105	105	106
Murphey (B)	K 240	111	101	98	98	86				94	96	100
Wesley (B)	K 240	106	96	100	97	109				102	100	101
DKC 3438 (B)	K 240	97	104	101	100	102				101	102	101
Plutor (B)	K 240	96	106	103	105	99				102	103	102
LG 32257 (B)	K 240	101	106	96	102	103				100	102	102
P 8317	K 250		105	104	101	91				99	101	
DKC 3323	K 250		112	108	107	105				107	108	
LID 2404 C	K 240		99	101	97	98				99	99	
DKC3400*	K 240		102	102	100	101				101	102	
Justy*	K 250		102	100	102	95				99	100	
KWS Arturello	K 240			110	113	105				109		
Agro Sana	K 240			105	103	103				104		
Evidence	K 240			89	105	100				98		
KWS Lupollino	K 240			100	103	91				98		
Amarone	K 250			103	114	101				106		
LID 2020 C*	K 240			103	103	99				102		
P8436*	ca. K 240			111	111	104				109		
Mittel				100	101	99		97	103			
Mittel (B) dt/ha		89,2	98,7	147,4	126,6	137,0		94,5	93,8	137,0	121,7	112,4
GD				11	8	9		11	10			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Körnermais 2022 - 2024, Anbaugesamt D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Kornertrag bei 86% TM dt/ha

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024						23-24	22-24	
		2	2	3						5	7	
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Tützpatz	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit (B)	K 210	84,1	99,4	152,0	127,0	130,2		94,8	82,2	136,4	121,6	110,9
RGT Exxon (B)	K 220	80,2	95,8	137,6	118,2	137,4		95,3	94,1	131,1	117,0	106,5
KWS Emporio (B)	K 210	90,8	89,1	144,5	137,9	143,2		100,9	100,6	141,8	120,7	112,2
Farmactos (B)	K 210	86,7	90,6	131,8	112,5	128,8		87,2	97,6	124,4	110,9	103,9
Chelsey	K 210		97,6	140,8	122,2	131,8		84,5	89,9	131,6	118,0	
RGT Alyxx Duo	K 220		105,0	143,6	117,2	120,2		89,2	97,3	127,0	118,2	
Amatino	K 190			133,6	120,6	125,5		87,5	100,8	126,6		
Aroldo	K 210			149,7	127,3	140,5		96,1	101,4	139,2		
LG 31230*	K 220			135,8	114,8	130,6		97,1	99,9	127,1		
LID 1015 C*	K 210			136,4	116,0	135,6		92,5	103,3	129,3		
P 7818*	K 220			156,3	117,0	146,3		88,9	89,3	139,9		
KWS Gustavius (B)	K 230	85,2	94,7	159,9	128,5	136,1		94,1	94,4	141,5	122,8	112,0
ES Traveler (B)	K 250	92,4	104,7	152,8	125,8	142,6				140,4	126,1	116,5
Glutexo* (B)	K 250	95,3	103,8	156,3	133,4	143,5				144,4	128,2	118,8
Murphey (B)	K 240	99,0	99,6	144,3	124,1	118,1				128,8	117,1	112,0
Wesley (B)	K 240	94,3	94,9	147,3	122,5	149,1				139,7	121,8	113,9
DKC 3438 (B)	K 240	86,8	102,8	148,3	127,0	139,4				138,2	124,1	113,4
Plutor (B)	K 240	86,0	104,2	151,8	132,6	135,4				139,9	125,6	114,3
LG 32257 (B)	K 240	90,0	104,8	142,0	129,3	140,8				137,4	124,3	114,5
P 8317	K 250		103,5	153,1	128,4	125,2				135,6	122,7	
DKC 3323	K 250		110,2	159,9	134,9	143,2				146,0	131,7	
LID 2404 C	K 240		97,4	149,2	122,6	134,0				135,3	120,1	
DKC3400*	K 240		101,2	150,6	127,2	138,5				138,8	123,7	
Justy*	K 250		101,0	147,1	128,7	130,2				135,3	121,6	
KWS Arturello	K 240			161,6	142,9	144,0				149,5		
Agro Sana	K 240			154,6	129,8	141,5				142,0		
Evidence	K 240			131,2	132,6	137,4				133,7		
KWS Lupollino	K 240			147,4	130,9	124,9				134,4		
Amarone	K 250			152,3	144,7	138,1				145,0		
LID 2020 C*	K 240			152,2	130,4	136,1				139,6		
P8436*	ca. K 240			164,3	140,8	142,5				149,2		
Mittel				148,0	127,3	135,8		92,0	96,4			
Mittel (B)		89,2	98,7	147,4	126,6	137,0		94,5	93,8	137,0	121,7	112,4
GD				15,5	9,7	13,0		10,0	9,4			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Körnermais 2022 - 2024, Anbaugesbiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Trockenmassegehalt Korn %

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024						23-24	22-24	
		2	2	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Tützpatz	Vipperow	3	5	7
Sorte		Mittel	Mittel							Mittel	Mittel	Mittel
Amavit (B)	K 210	75,8	76,3	77,0	77,3	66,9		72,8	83,4	73,7	74,8	75,1
RGT Exxon (B)	K 220	74,9	74,7	74,4	76,3	70,9		71,2	81,8	73,9	74,2	74,4
KWS Emporio (B)	K 210	75,7	75,9	76,6	77,7	72,3		72,3	83,6	75,5	75,7	75,7
Farmactos (B)	K 210	76,1	75,4	76,8	76,3	71,1		70,3	82,2	74,7	75,0	75,3
Chelsey	K 210		75,9	75,2	75,1	69,6		72,5	84,8	73,3	74,3	
RGT Alyxx Duo	K 220		76,8	75,0	77,2	62,0		68,8	84,4	71,4	73,6	
Amatino	K 190			77,9	77,8	75,6		74,6	84,5	77,1		
Aroldo	K 210			75,9	77,2	68,6		70,0	83,5	73,9		
LG 31230*	K 220			75,4	75,4	70,4		69,4	83,4	73,7		
LID 1015 C*	K 210			76,5	77,3	71,8		72,7	84,2	75,2		
P 7818*	K 220			80,2	80,2	76,1		73,7	83,9	78,8		
KWS Gustavius (B)	K 230	76,5	78,2	77,6	79,2	73,7		70,2	82,1	76,8	77,4	77,1
ES Traveler (B)	K 250	73,7	73,9	74,8	76,9	71,5				74,4	74,2	74,0
Glutexo* (B)	K 250	74,1	72,5	72,6	74,6	67,9				71,7	72,0	72,6
Murphey (B)	K 240	74,7	73,0	71,0	76,1	62,6				69,9	71,1	72,1
Wesley (B)	K 240	74,4	74,4	75,5	75,7	73,1				74,8	74,6	74,6
DKC 3438 (B)	K 240	74,9	76,0	75,5	78,7	71,8				75,4	75,6	75,4
Plutor (B)	K 240	75,2	75,9	76,9	77,7	71,2				75,3	75,5	75,4
LG 32257 (B)	K 240	74,7	74,6	73,2	75,8	70,7				73,2	73,8	74,0
P 8317	K 250		74,5	74,9	75,3	66,0				72,1	73,1	
DKC 3323	K 250		75,1	75,3	76,5	68,8				73,5	74,2	
LID 2404 C	K 240		75,4	76,8	77,4	70,4				74,9	75,1	
DKC3400*	K 240		76,6	76,6	76,2	71,7				74,8	75,5	
Justy*	K 250		74,0	71,0	75,5	66,1				70,8	72,1	
KWS Arturello	K 240			76,6	78,0	70,0				74,8		
Agro Sana	K 240			75,9	76,1	72,6				74,9		
Evidence	K 240			75,0	76,0	68,0				73,0		
KWS Lupollino	K 240			74,4	75,7	65,4				71,9		
Amarone	K 250			75,5	77,8	68,8				74,0		
LID 2020 C*	K 240			76,8	76,3	65,3				72,8		
P8436*	ca. K 240			76,6	79,2	71,3				75,7		
Mittel				75,6	76,9	69,8		71,8	83,7			
Mittel (B)		75,1	75,1	75,1	76,9	70,3		71,3	82,6	74,1	74,5	74,7

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Körnermais 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Trockenmassegehalt Korn % - relativ

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024						23-24	22-24	
		2	2	3						5	7	
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Tützpatz	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit (B)	K 210	101	102	102	101	95		102	101	99	100	101
RGT Exxon (B)	K 220	100	99	99	99	101		100	99	100	100	100
KWS Emporio (B)	K 210	101	101	102	101	103		101	101	102	102	101
Farmactos (B)	K 210	101	100	102	99	101		99	99	101	101	101
Chelsey	K 210		101	100	98	99		102	103	99	100	
RGT Alyxx Duo	K 220		102	100	100	88		96	102	96	99	
Amatino	K 190			104	101	108		105	102	104		
Aroldo	K 210			101	100	98		98	101	100		
LG 31230*	K 220			100	98	100		97	101	99		
LID 1015 C*	K 210			102	101	102		102	102	101		
P 7818*	K 220			107	104	108		103	102	106		
KWS Gustavius (B)	K 230	102	104	103	103	105		98	99	104	104	103
ES Traveler (B)	K 250	98	98	99	100	102				100	100	99
Glutexo* (B)	K 250	99	97	97	97	97				97	97	97
Murphey (B)	K 240	99	97	94	99	89				94	96	97
Wesley (B)	K 240	99	99	100	99	104				101	100	100
DKC 3438 (B)	K 240	100	101	101	102	102				102	102	101
Plutor (B)	K 240	100	101	102	101	101				102	101	101
LG 32257 (B)	K 240	100	99	97	99	100				99	99	99
P 8317	K 250		99	100	98	94				97	98	
DKC 3323	K 250		100	100	100	98				99	100	
LID 2404 C	K 240		100	102	101	100				101	101	
DKC3400*	K 240		102	102	99	102				101	101	
Justy*	K 250		99	94	98	94				96	97	
KWS Arturello	K 240			102	101	100				101		
Agro Sana	K 240			101	99	103				101		
Evidence	K 240			100	99	97				99		
KWS Lupollino	K 240			99	99	93				97		
Amarone	K 250			100	101	98				100		
LID 2020 C*	K 240			102	99	93				98		
P8436*	ca. K 240			102	103	101				102		
Mittel				101	100	99		101	101			
Mittel (B) %		75,1	75,1	75,1	76,9	70,3		71,3	82,6	74,1	74,5	74,7

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Körnermais 2022 - 2024, Anbaubereich D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Bereinigte Marktleistung Euro / ha

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024						2023-24	2022-24	
		2	2	3						5	7	
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäfschen	Tützpatz	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit (B)	K 210	2421	1620	2620	2200	1791		1506	1564	2204	1970	2099
RGT Exxon (B)	K 220	2276	1513	2259	2011	2097		1464	1752	2122	1879	1992
KWS Emporio (B)	K 210	2611	1444	2473	2407	2250		1575	1930	2376	2004	2177
Farmactos (B)	K 210	2501	1458	2262	1915	1977		1311	1821	2051	1814	2010
Chelsey	K 210		1583	2349	2034	1943		1378	1727	2108	1898	
RGT Alyxx Duo	K 220		1740	2386	2026	1399		1296	1876	1937	1858	
Amatino	K 190			2339	2107	2112		1428	1929	2186		
Aroldo	K 210			2530	2200	2029		1395	1938	2253		
LG 31230*	K 220			2274	1921	1968		1427	1921	2055		
LID 1015 C*	K 210			2330	2009	2108		1449	1988	2149		
P 7818*	K 220			2837	2123	2482		1415	1707	2481		
KWS Gustavius (B)	K 230	2475	1610	2782	2298	2204		1432	1740	2428	2101	2208
ES Traveler (B)	K 250	2573	1618	2525	2166	2206				2299	2026	2183
Glutexo* (B)	K 250	2674	1560	2477	2198	2030				2235	1965	2168
Murphey (B)	K 240	2804	1513	2203	2106	1415				1908	1750	2051
Wesley (B)	K 240	2657	1494	2474	2065	2388				2309	1983	2175
DKC 3438 (B)	K 240	2464	1672	2490	2255	2173				2306	2052	2170
Plutor (B)	K 240	2452	1692	2612	2312	2084				2336	2079	2185
LG 32257 (B)	K 240	2552	1653	2281	2182	2133				2199	1980	2144
P 8317	K 250		1629	2541	2146	1679				2122	1925	
DKC 3323	K 250		1750	2670	2308	2079				2353	2111	
LID 2404 C	K 240		1560	2561	2125	2017				2234	1964	
DKC3400*	K 240		1664	2575	2163	2146				2295	2042	
Justy*	K 250		1570	2246	2156	1745				2049	1857	
KWS Arturello	K 240			2763	2504	2150				2473		
Agro Sana	K 240			2613	2203	2242				2353		
Evidence	K 240			2180	2248	1948				2125		
KWS Lupollino	K 240			2424	2205	1645				2091		
Amarone	K 250			2555	2527	2004				2362		
LID 2020 C*	K 240			2611	2220	1780				2204		
P8436*	ca. K 240			2809	2516	2196				2507		
Mittel				2485	2189	2014		1430	1838			
Mittel (B)		2538	1571	2455	2176	2062		1458	1761	2231	1967	2130

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Berechnungsgrundlage	2022	2023	2024
Marktpreis €/dt	32	20	20
Trocknungskosten €/%	0,20	0,18	0,16
MWST %	9,50	9,00	9,00
Faktor Trocknungsschwund	1,35	1,35	1,35

LSV Körnermais 2022 - 2024, Anbaubereich D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Bereinigte Marktleistung Euro / ha - relativ

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024						3	23-24	22-24
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Tützpatz	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Sorte												
Amavit (B)	K 210	95	103	107	101	87		103	89	99	100	99
RGT Exxon (B)	K 220	90	96	92	92	102		100	99	95	96	94
KWS Emporio (B)	K 210	103	92	101	111	109		108	110	107	102	102
Farmactos (B)	K 210	99	93	92	88	96		90	103	92	92	94
Chelsey	K 210		101	96	93	94		95	98	95	97	
RGT Alyxx Duo	K 220		111	97	93	68		89	106	87	94	
Amatino	K 190			95	97	102		98	110	98		
Aroldo	K 210			103	101	98		96	110	101		
LG 31230*	K 220			93	88	95		98	109	92		
LID 1015 C*	K 210			95	92	102		99	113	96		
P 7818*	K 220			116	98	120		97	97	111		
KWS Gustavius (B)	K 230	98	103	113	106	107		98	99	109	107	104
ES Traveler (B)	K 250	101	103	103	100	107				103	103	102
Glutexo* (B)	K 250	105	99	101	101	98				100	100	102
Murphey (B)	K 240	110	96	90	97	69				86	89	96
Wesley (B)	K 240	105	95	101	95	116				103	101	102
DKC 3438 (B)	K 240	97	106	101	104	105				103	104	102
Plutor (B)	K 240	97	108	106	106	101				105	106	103
LG 32257 (B)	K 240	101	105	93	100	103				99	101	101
P 8317	K 250		104	104	99	81				95	98	
DKC 3323	K 250		111	109	106	101				105	107	
LID 2404 C	K 240		99	104	98	98				100	100	
DKC3400*	K 240		106	105	99	104				103	104	
Justy*	K 250		100	91	99	85				92	94	
KWS Arturello	K 240			113	115	104				111		
Agro Sana	K 240			106	101	109				105		
Evidence	K 240			89	103	94				95		
KWS Lupollino	K 240			99	101	80				94		
Amarone	K 250			104	116	97				106		
LID 2020 C*	K 240			106	102	86				99		
P8436*	ca. K 240			114	116	106				112		
Mittel				101	101	98		98	104			
Mittel (B) €/ha		2538	1571	2455	2176	2062		1458	1761	2231	1967	2130

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut
 * = EU-Sorte

Berechnungsgrundlage	2022	2023	2024
Marktpreis €/dt	32	20	20
Trocknungskosten €/%	0,20	0,18	0,16
MWST %	9,50	9,00	9,00
Faktor Trocknungsschwund	1,35	1,35	1,35

LSV Körnermais 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2022	2023	2024						23-24	22-24	
			2	3	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Tützpatz	Vipperow	4	7	9
			Mittel	Mittel							Mittel	Mittel	Mittel
	Amavit (B)	K 210	221	210	317	298	290	235	251		285	253	246
	RGT Exxon (B)	K 220	213	217	310	283	295	240	253		282	254	245
	KWS Emporio (B)	K 210	230	220	313	300	297	238	248		287	258	252
	Farmactos (B)	K 210	215	214	320	283	283	225	243		278	250	242
	Chelsey	K 210		228	329	312	323	265	249		307	273	
	RGT Alyxx Duo	K 220		216	301	270	270	229	236		267	246	
	Amatino	K 190			302	278	263	233	224		269		
	Aroldo	K 210			324	307	303	270	239		301		
	LG 31230*	K 220			323	290	270	235	244		279		
	LID 1015 C*	K 210			324	302	293	248	253		292		
	P 7818*	K 220			321	287	263	224	223		274		
	KWS Gustavius (B)	K 230	203	208	292	280	273	218	240		266	241	233
	ES Traveler (B)	K 250	217	236	337	315	300	240			298	271	259
	Glutexo* (B)	K 250	196	207	289	270	258	230			262	238	229
	Murphey (B)	K 240	239	240	350	330	317	268			316	284	274
	Wesley (B)	K 240	212	227	316	297	300	240			288	262	251
	DKC 3438 (B)	K 240	225	236	335	302	307	258			300	273	262
	Plutor (B)	K 240	217	215	290	270	267	238			266	244	238
	LG 32257 (B)	K 240	217	220	312	303	290	238			286	258	249
	P 8317	K 250		218	315	302	300	253			292	260	
	DKC 3323	K 250		232	325	303	303	243			293	267	
	LID 2404 C	K 240		236	340	303	293	253			297	271	
	DKC3400*	K 240		202	288	272	267	218			261	236	
	Justy*	K 250		216	317	288	287	228			280	252	
	KWS Arturello	K 240			297	283	270	238			272		
	Agro Sana	K 240			292	268	262	243			266		
	Evidence	K 240			314	288	287	231			280		
	KWS Lupollino	K 240			325	308	307	245			296		
	Amarone	K 250			287	298	283	230			275		
	LID 2020 C*	K 240			315	295	303	253			291		
	P8436*	ca. K 240			310	288	277	230			276		
	Mittel				314	293	287	240	241				
	Mittel (B)		217	221	315	294	290	239	247		284	257	248

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Körnermais 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Bestockung %

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024						1	23-24	22-24
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Tützpatz	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit (B)	K 210		43				3			3	23	
RGT Exxon (B)	K 220		85				41			41	63	
KWS Emporio (B)	K 210		47				5			5	26	
Farmactos (B)	K 210		42				5			5	24	
Chelsey	K 210		48				12			12	30	
RGT Alyxx Duo	K 220		66				19			19	43	
Amatino	K 190						8			8		
Aroldo	K 210						6			6		
LG 31230*	K 220						5			5		
LID 1015 C*	K 210						6			6		
P 7818*	K 220						18			18		
KWS Gustavius (B)	K 230		47				13			13	30	
ES Traveler (B)	K 250		66				17			17	42	
Glutexo* (B)	K 250		64				12			12	38	
Murphey (B)	K 240		60				12			12	36	
Wesley (B)	K 240		35				6			6	20	
DKC 3438 (B)	K 240		86				46			46	66	
Plutor (B)	K 240		38				10			10	24	
LG 32257 (B)	K 240		23				4			4	13	
P 8317	K 250		50				7			7	28	
DKC 3323	K 250		22				5			5	13	
LID 2404 C	K 240		33				9			9	21	
DKC3400*	K 240		81				20			20	50	
Justy*	K 250		50				18			18	34	
KWS Arturello	K 240						11			11		
Agro Sana	K 240						14			14		
Evidence	K 240						7			7		
KWS Lupollino	K 240						7			7		
Amarone	K 250						8			8		
LID 2020 C*	K 240						38			38		
P8436*	ca. K 240						22			22		
Mittel							13					
Mittel (B)			53				14			14	34	

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Körnermais 2022 - 2024, Anbaugesamt D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Pflanzen mit Beulenbrand %

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024						2023-24	2022-24	
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Tützpatz	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit (B)	K 210	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0				0,0	2,8	2,1
RGT Exxon (B)	K 220	0,3	8,8	0,0	0,0	0,7				0,2	4,5	3,4
KWS Emporio (B)	K 210	0,5	7,2	0,0	0,3	0,0				0,1	3,6	2,9
Farmactos (B)	K 210	3,3	8,8	0,0	0,0	0,0				0,0	4,4	4,1
Chelsey	K 210		5,8	0,0	0,0	0,3				0,1	2,9	
RGT Alyxx Duo	K 220		3,9	0,0	0,0	0,0				0,0	2,0	
Amatino	K 190			0,0	0,0	0,0				0,0		
Aroldo	K 210			0,0	0,0	0,3				0,1		
LG 31230*	K 220			0,0	0,0	1,0				0,3		
LID 1015 C*	K 210			0,0	0,0	0,0				0,0		
P 7818*	K 220			0,0	0,0	0,0				0,0		
KWS Gustavius (B)	K 230	1,5	14,8	1,3	0,0	1,0				0,8	7,8	6,2
ES Traveler (B)	K 250	0,8	23,8	0,0	0,0	0,3				0,1	12,0	9,2
Glutexo* (B)	K 250	0,3	1,9	0,0	0,0	0,0				0,0	1,0	0,8
Murphey (B)	K 240	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0				0,0	4,3	3,3
Wesley (B)	K 240	0,8	4,9	0,0	0,3	0,0				0,1	2,5	2,1
DKC 3438 (B)	K 240	0,0	13,6	0,0	0,0	1,0				0,3	7,0	5,2
Plutor (B)	K 240	0,5	7,6	0,0	0,0	0,0				0,0	3,8	3,0
LG 32257 (B)	K 240	0,0	10,6	0,0	0,0	0,3				0,1	5,3	4,0
P 8317	K 250		10,8	1,3	0,3	0,0				0,6	5,7	
DKC 3323	K 250		11,1	0,0	0,0	0,7				0,2	5,7	
LID 2404 C	K 240		11,6	0,0	0,7	0,3				0,3	6,0	
DKC3400*	K 240		18,5	0,0	0,0	0,3				0,1	9,3	
Justy*	K 250		7,2	0,0	0,0	0,0				0,0	3,6	
KWS Arturello	K 240			0,0	0,0	1,0				0,3		
Agro Sana	K 240			0,0	0,0	0,0				0,0		
Evidence	K 240			0,0	0,0	0,0				0,0		
KWS Lupollino	K 240			0,0	0,0	0,3				0,1		
Amarone	K 250			0,0	0,0	0,0				0,0		
LID 2020 C*	K 240			0,0	0,0	0,3				0,1		
P8436*	ca. K 240			0,0	0,0	0,7				0,2		
Mittel				0,1	0,1	0,3						
Mittel (B)		0,6	9,7	0,1	0,1	0,3				0,1	4,9	3,9

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Körnermais 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Datum des Aufgangs

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024						2024	23-24	22-24
		2	3	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Tützpatz	Vipperow	3	6	8
Sorte		Mittel	Mittel							Mittel	Mittel	Mittel
Amavit (B)	K 210	15.5	15.5	5.5	29.4	23.5				9.5	12.5	13.5
RGT Exxon (B)	K 220	15.5	15.5	5.5	29.4	23.5				9.5	12.5	13.5
KWS Emporio (B)	K 210	15.5	15.5	5.5	29.4	23.5				9.5	12.5	13.5
Farmactos (B)	K 210	15.5	15.5	5.5	29.4	23.5				9.5	12.5	13.5
Chelsey	K 210		15.5	5.5	29.4	23.5				9.5	12.5	
RGT Alyxx Duo	K 220		15.5	5.5	29.4	23.5				9.5	12.5	
Amatino	K 190			5.5	29.4	23.5				9.5		
Aroldo	K 210			5.5	29.4	23.5				9.5		
LG 31230*	K 220			5.5	29.4	23.5				9.5		
LID 1015 C*	K 210			5.5	29.4	23.5				9.5		
P 7818*	K 220			5.5	29.4	23.5				9.5		
KWS Gustavius (B)	K 230	15.5	15.5	5.5	29.4	23.5				9.5	12.5	13.5
ES Traveler (B)	K 250	15.5	15.5	5.5	29.4	23.5				9.5	12.5	13.5
Glutexo* (B)	K 250	15.5	15.5	5.5	29.4	23.5				9.5	12.5	13.5
Murphey (B)	K 240	15.5	15.5	5.5	29.4	23.5				9.5	12.5	13.5
Wesley (B)	K 240	15.5	15.5	5.5	29.4	23.5				9.5	12.5	13.5
DKC 3438 (B)	K 240	15.5	15.5	5.5	29.4	23.5				9.5	12.5	13.5
Plutor (B)	K 240	15.5	15.5	5.5	29.4	23.5				9.5	12.5	13.5
LG 32257 (B)	K 240	15.5	15.5	5.5	29.4	23.5				9.5	12.5	13.5
P 8317	K 250		15.5	5.5	29.4	23.5				9.5	12.5	
DKC 3323	K 250		15.5	5.5	29.4	23.5				9.5	12.5	
LID 2404 C	K 240		15.5	5.5	29.4	23.5				9.5	12.5	
DKC3400*	K 240		15.5	5.5	29.4	23.5				9.5	12.5	
Justy*	K 250		15.5	5.5	29.4	23.5				9.5	12.5	
KWS Arturello	K 240			5.5	29.4	23.5				9.5		
Agro Sana	K 240			5.5	29.4	23.5				9.5		
Evidence	K 240			5.5	29.4	23.5				9.5		
KWS Lupollino	K 240			5.5	29.4	23.5				9.5		
Amarone	K 250			5.5	29.4	23.5				9.5		
LID 2020 C*	K 240			5.5	29.4	23.5				9.5		
P8436*	ca. K 240			5.5	29.4	23.5				9.5		
Mittel				5.5	29.4	23.5						
Mittel (B)		15.5	15.5	5.5	29.4	23.5				9.5	12.5	13.5

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Körnermais 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Datum der weiblichen Blüte

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024						2023-24	2022-24	
		2	3							3	6	8
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Tützpatz	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit (B)	K 210	17.7	19.7	11.7	14.7	20.7				15.7	17.7	17.7
RGT Exxon (B)	K 220	17.7	18.7	11.7	7.7	18.7				12.7	15.7	15.7
KWS Emporio (B)	K 210	19.7	20.7	13.7	15.7	21.7				16.7	18.7	18.7
Farmactos (B)	K 210	19.7	19.7	13.7	16.7	25.7				18.7	18.7	18.7
Chelsey	K 210		20.7	11.7	15.7	21.7				15.7	18.7	
RGT Alyxx Duo	K 220		19.7	11.7	19.7	16.7				15.7	17.7	
Amatino	K 190			8.7	16.7	18.7				14.7		
Aroldo	K 210			13.7	14.7	18.7				15.7		
LG 31230*	K 220			8.7	8.7	16.7				10.7		
LID 1015 C*	K 210			13.7	16.7	20.7				16.7		
P 7818*	K 220			13.7	17.7	17.7				15.7		
KWS Gustavius (B)	K 230	19.7	21.7	13.7	15.7	17.7				15.7	18.7	18.7
ES Traveler (B)	K 250	18.7	19.7	8.7	11.7	20.7				13.7	16.7	16.7
Glutexo* (B)	K 250	18.7	20.7	8.7	8.7	18.7				11.7	15.7	16.7
Murphey (B)	K 240	21.7	19.7	13.7	9.7	18.7				13.7	16.7	17.7
Wesley (B)	K 240	21.7	18.7	11.7	15.7	20.7				15.7	16.7	18.7
DKC 3438 (B)	K 240	22.7	21.7	13.7	16.7	22.7				17.7	19.7	19.7
Plutor (B)	K 240	21.7	20.7	11.7	15.7	20.7				15.7	17.7	18.7
LG 32257 (B)	K 240	19.7	20.7	11.7	11.7	18.7				13.7	16.7	17.7
P 8317	K 250		21.7	13.7	19.7	24.7				18.7	20.7	
DKC 3323	K 250		20.7	8.7	11.7	18.7				12.7	16.7	
LID 2404 C	K 240		19.7	11.7	15.7	18.7				14.7	16.7	
DKC3400*	K 240		21.7	13.7	19.7	21.7				17.7	19.7	
Justy*	K 250		21.7	13.7	15.7	19.7				15.7	18.7	
KWS Arturello	K 240			13.7	18.7	22.7				17.7		
Agro Sana	K 240			13.7	15.7	22.7				16.7		
Evidence	K 240			8.7	14.7	17.7				13.7		
KWS Lupollino	K 240			11.7	14.7	18.7				14.7		
Amarone	K 250			13.7	15.7	18.7				15.7		
LID 2020 C*	K 240			13.7	17.7	18.7				16.7		
P8436*	ca. K 240			13.7	19.7	20.7				17.7		
Mittel				11.7	14.7	19.7						
Mittel (B)		19.7	19.7	11.7	12.7	19.7				14.7	17.7	17.7

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Körnermais 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Datum der Ernte

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024						2023-24	22-24	
		2	2							3	5	7
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäßchen	Tützpatz	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
Amavit (B)	K 210	19.10	23.10	7.10	9.10	20.9				2.10	10.10	13.10
RGT Exxon (B)	K 220	19.10	23.10	7.10	9.10	20.9				2.10	10.10	13.10
KWS Emporio (B)	K 210	19.10	23.10	7.10	9.10	20.9				2.10	10.10	13.10
Farmactos (B)	K 210	19.10	23.10	7.10	9.10	20.9				2.10	10.10	13.10
Chelsey	K 210		23.10	7.10	9.10	20.9				2.10	10.10	
RGT Alyxx Duo	K 220		23.10	7.10	9.10	20.9				2.10	10.10	
Amatino	K 190			7.10	9.10	20.9				2.10		
Aroldo	K 210			7.10	9.10	20.9				2.10		
LG 31230*	K 220			7.10	9.10	20.9				2.10		
LID 1015 C*	K 210			7.10	9.10	20.9				2.10		
P 7818*	K 220			7.10	9.10	20.9				2.10		
KWS Gustavius (B)	K 230	19.10	23.10	7.10	9.10	20.9				2.10	10.10	13.10
ES Traveler (B)	K 250	19.10	23.10	7.10	9.10	20.9				2.10	10.10	13.10
Glutexo* (B)	K 250	19.10	23.10	7.10	9.10	20.9				2.10	10.10	13.10
Murphey (B)	K 240	19.10	23.10	7.10	9.10	20.9				2.10	10.10	13.10
Wesley (B)	K 240	19.10	23.10	7.10	9.10	20.9				2.10	10.10	13.10
DKC 3438 (B)	K 240	19.10	23.10	7.10	9.10	20.9				2.10	10.10	13.10
Plutor (B)	K 240	19.10	23.10	7.10	9.10	20.9				2.10	10.10	13.10
LG 32257 (B)	K 240	19.10	23.10	7.10	9.10	20.9				2.10	10.10	13.10
P 8317	K 250		23.10	7.10	9.10	20.9				2.10	10.10	
DKC 3323	K 250		23.10	7.10	9.10	20.9				2.10	10.10	
LID 2404 C	K 240		23.10	7.10	9.10	20.9				2.10	10.10	
DKC3400*	K 240		23.10	7.10	9.10	20.9				2.10	10.10	
Justy*	K 250		23.10	7.10	9.10	20.9				2.10	10.10	
KWS Arturello	K 240			7.10	9.10	20.9				2.10		
Agro Sana	K 240			7.10	9.10	20.9				2.10		
Evidence	K 240			7.10	9.10	20.9				2.10		
KWS Lupollino	K 240			7.10	9.10	20.9				2.10		
Amarone	K 250			7.10	9.10	20.9				2.10		
LID 2020 C*	K 240			7.10	9.10	20.9				2.10		
P8436*	ca. K 240			7.10	9.10	20.9				2.10		
Mittel				7.10	9.10	20.9						
Mittel (B)		19.10	23.10	7.10	9.10	20.9				2.10	10.10	13.10

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte