

LSV Winterroggen 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern,
KWS, Hybro Saatzucht, Saatzucht Steinach)

Sortenempfehlung 2026 / 2027:

Hybridsorten: KWS Tayo, SU Karlsson¹⁾, KWS Emphor, KWS Baridor, SU Erling¹⁾
Populationsorte: SU Bebop

¹⁾ Z-Saatgut enthält 10% Populationsroggen

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ

Anzahl Orte		2024 7	2025 7	2026											7	24-26 21	25/26 14
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Petkus	Sonnevalde	Mittel	Mittel	Mittel	
ohne Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	103	100	103	105			102		102	111	109	110	106	103	103	
	SU Karlsson(B)	102	98	102	102			102		104	98	105	100	102	100	100	
	KWS Emphor(B)	102	104	98	104			101		100	105	110	102	103	103	103	
	KWS Baridor(B)	102	106	99	99			105		100	98	101	103	101	103	103	
	SU Erling(B)	103	106	105	104			103		105	100	101	102	103	104	104	
	SU Fred		100	99	103			95		102	96	105	116	102		101	
	SU Fenn			101	106			95		101	110	94	95	101			
	Farmaleo			104	103			105		105	94	102	100	102			
	SU Bebop(B)*	88	86	92	85			88		89	87	75	83	86	86	86	
	Mittel			105	101			99		101	100	100	101				
Mittel (B)	66,3	68,1	73,3	85,2			72,7		79,8	80,4	62,2	63,3	73,8	69,4	71,0		
Grenzdiff.			9	7			15		8	13	12	14					
Anzahl Orte		10	9	2026											10	24-26 29	25/26 19
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Petkus	Sonnevalde	Mittel	Mittel	Mittel	
mit Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	102	101	101	105	105	111	104	106	102	105	107	114	106	103	104	
	SU Karlsson(B)	100	100	98	107	100	100	103	104	101	97	104	100	101	101	101	
	KWS Emphor(B)	102	107	103	98	98	102	101	98	103	104	104	104	102	104	104	
	KWS Baridor(B)	102	102	103	99	103	97	94	100	98	102	101	102	100	101	101	
	SU Erling(B)	104	103	101	105	103	105	102	107	104	104	99	94	102	103	103	
	SU Fred		97	100	106	100	97	104	101	101	100	100	95	100		99	
	SU Fenn			100	105	94	98	92	99	103	102	98	91	98			
	Farmaleo			95	101	99	102	96	101	104	97	97	108	100			
	SU Bebop(B)*	90	86	95	86	90	86	96	85	92	87	85	86	89	88	87	
	Mittel			102	101	101	100	99	101	101	100	99	99				
Mittel (B)	80,8	79,8	79,2	93,3	57,9	95,4	79,1	73,5	84,7	89,2	86,9	72,7	81,2	80,6	80,5		
Grenzdiff.			8	6	4	10	14	6	8	11	9	12					

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = Populationsorte

LSV Winterroggen 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern,
KWS, Hybro Saatzucht, Saatzucht Steinach)

Korntrag bei 86% TS dt/ha

Anzahl Orte		2024 7	2025 7	2026												7	24-26 21	25/26 14
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Petkus	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel		
ohne Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	68,6	68,3	75,2	89,6			74,3		81,4	89,5	67,7	69,6	78,2	71,7	73,3		
	SU Karlsson(B)	67,4	66,4	74,9	87,1			74,2		83,1	78,8	65,3	63,3	75,2	69,7	70,8		
	KWS Emphor(B)	67,9	70,9	72,2	88,7			73,1		79,8	84,5	68,4	64,5	75,9	71,6	73,4		
	KWS Baridor(B)	67,5	72,3	72,8	84,6			76,3		80,1	78,6	62,7	65,6	74,4	71,4	73,4		
	SU Erling(B)	68,4	72,2	77,0	89,0			74,7		83,4	80,6	62,8	64,9	76,0	72,2	74,1		
	SU Fred		68,0	72,7	87,5			69,3		81,1	77,2	65,3	73,3	75,2		71,6		
	SU Fenn			73,7	90,0			69,2		80,9	88,6	58,4	60,1	74,4				
	Farmaleo			76,5	87,7			76,1		83,7	75,7	63,6	63,2	75,2				
	SU Bebop(B)*	58,2	58,5	67,6	72,2			63,6		70,9	70,3	46,5	52,4	63,3	60,0	60,9		
	Mittel			76,6	86,3			72,3		80,5	80,4	62,3	64,1					
Mittel (B)	66,3	68,1	73,3	85,2			72,7		79,8	80,4	62,2	63,3	73,8	69,4	71,0			
Grenzdif.			6,7	5,7			11,0		6,4	10,2	7,5	8,7						
Anzahl Orte		10	9	2026												10	24-26 29	25/26 19
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Petkus	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel		
mit Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	82,3	80,9	80,2	97,7	60,6	106,2	82,3	77,7	86,3	93,9	92,8	82,8	86,0	83,1	83,6		
	SU Karlsson(B)	81,0	79,7	77,4	99,7	58,1	95,0	81,7	76,2	85,8	86,8	90,8	72,6	82,4	81,1	81,1		
	KWS Emphor(B)	82,7	85,7	81,7	91,6	57,0	97,3	79,5	72,2	87,6	92,4	90,3	75,7	82,5	83,6	84,0		
	KWS Baridor(B)	82,1	81,4	81,2	92,3	59,7	92,3	74,6	73,6	82,8	91,4	87,8	74,4	81,0	81,5	81,2		
	SU Erling(B)	83,7	82,5	79,9	97,9	59,4	99,9	80,6	78,9	87,9	92,8	86,1	68,3	83,2	83,1	82,9		
	SU Fred		77,2	79,4	99,2	58,0	92,3	81,9	74,0	85,3	89,5	87,1	69,0	81,6		79,5		
	SU Fenn			78,9	98,0	54,4	93,6	72,6	72,5	87,2	91,0	85,0	66,4	79,9				
	Farmaleo			75,5	94,2	57,2	97,6	75,8	74,4	87,9	86,6	84,6	78,3	81,2				
	SU Bebop(B)*	72,9	68,5	75,0	80,7	52,4	81,9	75,6	62,5	77,9	78,1	73,9	62,7	72,1	71,2	70,4		
	Mittel			81,0	94,6	58,3	95,1	78,3	74,2	85,4	89,2	86,5	72,2					
	Mittel (B)	80,8	79,8	79,2	93,3	57,9	95,4	79,1	73,5	84,7	89,2	86,9	72,7	81,2	80,6	80,5		
	Grenzdif.			6,7	5,7	2,4	9,8	11,0	4,7	6,4	10,2	7,5	8,7					

Mittel (B) = Bezugsbasis
* = Populationssorte

LSV Winterroggen 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern,
 KWS, Hybro Saatzeit, Saatzeit Steinach)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - Behandlungseffekt (Stufe 2 minus Stufe 1)

Anzahl Orte		2024	2025	2026											7	24-26	25/26
	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Petkus	Sonnevalde		Mittel	Mittel	Mittel
	KWS Tayo(B)	13,7	12,6	5,0	8,0			8,0		4,9	4,4	25,1	13,2		7,9	11,5	10,4
	SU Karlsson(B)	13,5	13,2	2,5	12,6			7,5		2,8	8,1	25,5	9,3		7,2	11,4	10,3
	KWS Emphor(B)	14,8	14,7	9,5	2,9			6,5		7,8	7,9	21,9	11,2		6,6	12,0	10,6
	KWS Baridor(B)	14,6	9,1	8,4	7,7			-1,7		2,7	12,8	25,1	8,9		6,6	10,1	7,9
	SU Erling(B)	15,2	10,3	2,9	9,0			5,8		4,5	12,3	23,4	3,4		7,1	10,9	8,8
	SU Fred		9,2	6,8	11,7			12,6		4,2	12,3	21,8	-4,3		6,4	0,0	7,9
	SU Fenn			5,2	7,9			3,4		6,4	2,4	26,7	6,3		5,6	0,0	0,0
	Farmaleo			-1,0	6,6			-0,4		4,3	11,0	21,0	15,1		6,0	0,0	0,0
	SU Bebo(B)*	14,7	10,1	7,4	8,5			12,0		7,0	7,8	27,4	10,3		8,7	11,2	9,5
	Mittel			4,3	8,3			6,0		4,9	8,8	24,2	8,2				
	Mittel (B)	14,4	11,7	6,0	8,1			6,3		4,9	8,9	24,7	9,4		7,4	11,2	9,6
	Grenzdiff.																

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = Populationssorte

LSV Winterroggen 2024 - 2026, Anbaubereich D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern, KWS, Hybro Saatzucht, Saatzucht Steinach)

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte		2024 7	2025 6	2026											7	24-26 20	25/26 13
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Petkus	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel	
ohne Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	148	151	138	158			161		165	160	163	168	159	153	155	
	SU Karlsson(B)	152	152	135	163			162		173	170	168	170	163	156	158	
	KWS Emphor(B)	145	146	127	154			152		163	163	158	165	154	148	150	
	KWS Baridor(B)	151	152	138	158			163		170	170	165	168	162	155	157	
	SU Erling(B)	148	149	133	154			166		170	170	163	170	161	153	155	
	SU Fred		154	142	158			155		178	175	168	173	164		159	
	SU Fenn			134	158			163		170	170	160	165	160			
	Farmaleo			131	166			166		173	170	163	168	162			
	SU Bebop(B)*	157	157	144	173			181		188	178	173	178	173	163	166	
	Mittel			131	160			163		172	169	164	169				
Mittel (B)	150	151	136	160			164		171	168	165	170	162	154	157		
Grenzdif.																	
Anzahl Orte		9	8	2026											9	24-26 26	25/26 17
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Petkus	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel	
mit Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	134	138	127	151	130	158	143		165	160	140	172	150	141	144	
	SU Karlsson(B)	132	137	129	152	130	160	142		173	170	133	173	151	140	145	
	KWS Emphor(B)	129	135	125	146	124	158	134		160	163	130	172	146	137	141	
	KWS Baridor(B)	137	143	129	156	130	160	145		170	172	140	170	152	144	148	
	SU Erling(B)	131	135	127	145	131	160	139		168	170	130	173	149	138	142	
	SU Fred		142	136	162	138	162	142		175	173	133	175	155		149	
	SU Fenn			128	154	134	162	135		165	173	133	168	150			
	Farmaleo			127	155	130	168	126		168	170	128	170	149			
	SU Bebop(B)*	144	150	138	165	145	175	145		185	178	145	178	162	152	156	
	Mittel			125	154	132	163	139		170	170	134	172				
Mittel (B)	135	140	129	152	132	162	141		170	169	136	173	152	142	146		
Grenzdif.																	

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = Populationssorte

LSV Winterroggen 2024 - 2026, Anbaubereich D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern,
KWS, Hybro Saatzucht, Saatzucht Steinach)

Ähren je m²

Anzahl Orte		2024 7	2025 6	2026											6	24-26 19	25/26 12
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Petkus	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel	
ohne Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	548	544	443	452					460	493	705	985	589	560	567	
	SU Karlsson(B)	545	574	504	556					504	504	721	856	607	574	591	
	KWS Emphor(B)	571	550	432	468					428	548	667	730	545	556	548	
	KWS Baridor(B)	514	545	497	476					484	471	630	711	545	533	545	
	SU Erling(B)	553	557	500	428					544	526	696	759	576	561	566	
	SU Fred		548	422	500					488	456	725	715	551		550	
	SU Fenn			536	496					520	463	734	889	606			
	Farmaleo			604	540					536	530	634	733	596			
	SU Bebop(B)*	556	532	540	492					472	526	758	671	576	555	554	
	Mittel			506	490					493	502	696	783				
Mittel (B)	548	550	486	479					482	511	696	785	573	557	562		
Grenzdiff.																	
Anzahl Orte		8	7	2026											7	24-26 22	25/26 14
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Petkus	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel	
mit Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	538	565	540	488		509			484	509	705	1052	612	570	589	
	SU Karlsson(B)	567	543	511	512		459			472	469	680	916	574	562	559	
	KWS Emphor(B)	569	565	625	480		482			476	548	809	815	605	579	585	
	KWS Baridor(B)	566	560	558	492					472	491	654	788	576	567	567	
	SU Erling(B)	564	600	489	460		523			508	526	654	807	567	576	583	
	SU Fred		569	511	532		533			488	486	713	763	575		572	
	SU Fenn			590	520		469			544	476	638	916	593			
	Farmaleo			482	516		479			552	541	896	780	607			
	SU Bebop(B)*	559	534	650	544		516			504	509	759	662	592	562	563	
	Mittel			561	505					500	506	723	833				
	Mittel (B)	560	561	562	496		498			486	509	710	840	588	569	573	
	Grenzdiff.																

Mittel (B) = Bezugsbasis
* = Populationssorte

LSV Winterroggen 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern,
KWS, Hybro Saatzucht, Saatzucht Steinach)

Halmknicken (1-9)

Anzahl Orte		2024 4	2025 4	2026											2	24-26 10	25/26 6
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Petkus	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel	
ohne Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	4,4	3,9	3,5	5,0									4,3	4,2	4,0	
	SU Karlsson(B)	6,0	4,0	3,5	5,5									4,5	4,9	4,2	
	KWS Emphor(B)	4,4	3,8	3,5	6,0									4,8	4,2	4,1	
	KWS Baridor(B)	4,5	3,8	3,0	5,0									4,0	4,1	3,8	
	SU Erling(B)	4,6	3,6	2,5	4,5									3,5	4,0	3,6	
	SU Fred		3,5	3,5	5,5									4,5		3,8	
	SU Fenn			3,0	6,0									4,5			
	Farmaleo			3,5	5,0									4,3			
	SU Bebop(B)*	5,9	4,1	4,5	6,0									5,3	5,1	4,5	
	Mittel			3,3	5,4												
Mittel (B)	5,0	3,9	3,4	5,3									4,4	4,4	4,0		
Grenzdiff.																	
Anzahl Orte		5	5	2026											3	24-26 13	25/26 8
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Petkus	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel	
mit Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	2,6	2,1	3,0	5,0	3,0								3,7	2,7	2,7	
	SU Karlsson(B)	3,3	2,1	3,0	6,0	2,3								3,8	2,9	2,7	
	KWS Emphor(B)	2,4	2,3	2,5	5,0	3,5								3,7	2,7	2,8	
	KWS Baridor(B)	2,7	1,9	3,0	5,0	3,3								3,8	2,6	2,6	
	SU Erling(B)	2,5	1,9	2,0	5,0	1,8								2,9	2,4	2,3	
	SU Fred		1,8	3,0	5,0	2,3								3,4		2,4	
	SU Fenn			2,5	5,5	2,5								3,5			
	Farmaleo			2,5	5,0	3,8								3,8			
	SU Bebop(B)*	3,4	2,2	3,0	5,0	2,8								3,6	3,0	2,7	
	Mittel			2,7	5,2	2,9											
	Mittel (B)	2,8	2,1	2,8	5,2	2,8								3,6	2,7	2,6	
	Grenzdiff.																

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = Populationssorte

LSV Winterroggen 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern,
KWS, Hybro Saatzucht, Saatzucht Steinach)

Lager nach Blüte (1-9)

Anzahl Orte		2024	2025	2026											1	24-26	25/26
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Petkus	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid/WR	KWS Tayo(B)												3,0	3,0			
	SU Karlsson(B)												4,0	4,0			
	KWS Emphor(B)												4,0	4,0			
	KWS Baridor(B)												4,0	4,0			
	SU Erling(B)												3,5	3,5			
	SU Fred												2,5	2,5			
	SU Fenn												5,0	5,0			
	Farmaleo												5,5	5,5			
	SU Bebop(B)*												4,0	4,0			
	Mittel												3,9				
	Mittel (B)												3,8	3,8			
	Grenzdif.																
Anzahl Orte		0	0	2026											1	24-26	25/26
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Petkus	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid/WR	KWS Tayo(B)												1,0	1,0			
	SU Karlsson(B)												1,3	1,3			
	KWS Emphor(B)												1,3	1,3			
	KWS Baridor(B)												2,3	2,3			
	SU Erling(B)												1,0	1,0			
	SU Fred												1,0	1,0			
	SU Fenn												2,3	2,3			
	Farmaleo												2,0	2,0			
	SU Bebop(B)*												1,3	1,3			
	Mittel												1,5				
	Mittel (B)												1,4	1,4			
	Grenzdif.																

Mittel (B) = Bezugsbasis
* = Populationssorte

LSV Winterroggen 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern,
KWS, Hybro Saatzucht, Saatzucht Steinach)

Lager vor Ernte (1-9)

Anzahl Orte		2024 6	2025 6	2026											7	24-26 19	25/26 13
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Petkus	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel	
ohne Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	3,6	4,0	1,0	4,5			7,5		2,0	4,0	6,5	9,0	4,9	4,2	4,5	
	SU Karlsson(B)	4,2	5,7	1,0	3,0			7,5		1,0	4,5	9,0	9,0	5,0	4,9	5,3	
	KWS Emphor(B)	3,3	5,2	1,0	4,0			7,5		1,0	5,0	9,0	9,0	5,2	4,6	5,2	
	KWS Baridor(B)	3,4	5,0	1,0	4,0			7,5		2,0	6,0	9,0	9,0	5,5	4,7	5,3	
	SU Erling(B)	3,4	4,5	1,0	4,0			7,5		2,0	5,5	9,0	9,0	5,4	4,5	5,0	
	SU Fred		4,2	1,0	4,0			7,5		2,0	5,0	9,0	9,0	5,4		4,8	
	SU Fenn			1,0	4,5			6,0		3,0	6,0	9,0	9,0	5,5			
	Farmaleo			1,0	3,5			7,5		2,0	7,0	9,0	9,0	5,6			
	SU Bebop(B)*	3,8	4,8	1,0	4,5			7,5		2,0	4,0	7,0	9,0	5,0	4,6	4,9	
	Mittel			1,0	4,0			7,3		1,9	5,2	8,5	9,0				
	Mittel (B)	3,6	4,9	1,0	4,0			7,5		1,7	4,8	8,3	9,0	5,2	4,6	5,0	
	Grenzdif.																
Anzahl Orte		7	8	2026											9	24-26 24	25/26 17
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Petkus	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel	
mit Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	2,3	2,1	1,0	4,5	1,0	7,3	2,0		1,5	3,7	2,0	9,0	3,6	2,7	2,9	
	SU Karlsson(B)	2,8	2,1	1,0	4,5	1,0	8,3	2,0		1,5	5,3	2,0	9,0	3,8	3,0	3,0	
	KWS Emphor(B)	2,0	2,3	1,0	3,5	1,0	8,7	2,0		1,5	6,7	2,5	9,0	4,0	2,8	3,2	
	KWS Baridor(B)	2,1	2,6	1,0	4,0	1,0		2,0		1,5	6,3	3,0	9,0	3,5	2,8	3,1	
	SU Erling(B)	2,2	1,8	1,0	3,0	1,0	7,7	2,0		1,0	3,3	2,5	9,0	3,4	2,5	2,6	
	SU Fred		2,0	1,0	4,5	1,0	8,3	2,0		1,5	4,0	2,5	9,0	3,8		2,9	
	SU Fenn			1,0	3,5	1,8	9,0	2,0		1,5	5,7	3,0	9,0	4,1			
	Farmaleo			1,0	5,0	1,0	8,3	2,0		1,0	6,3	2,5	9,0	4,0			
	SU Bebop(B)*	2,9	2,4	1,0	4,5	1,0	8,3	2,0		1,5	4,3	3,0	9,0	3,8	3,1	3,2	
	Mittel			1,0	4,1	1,1		2,0		1,4	5,1	2,6	9,0				
	Mittel (B)	2,4	2,2	1,0	4,0	1,0	8,1	2,0		1,4	4,9	2,5	9,0	3,7	2,8	3,0	
	Grenzdif.																

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = Populationssorte

LSV Winterroggen 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern,
KWS, Hybro Saatzucht, Saatzucht Steinach)

Braunrost (1-9)

Anzahl Orte		2024 7	2025 6	2026											6	24-26 19	25/26 12
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Petkus	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel	
ohne Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	6,6	5,8	7,0	1,0			3,5		5,5	3,0		4,0	4,0	5,5	4,9	
	SU Karlsson(B)	5,8	5,3	6,5	1,0			3,5		6,5	2,0		3,5	3,8	5,0	4,6	
	KWS Emphor(B)	6,6	5,8	7,0	1,0			3,5		7,0	4,0		4,5	4,5	5,7	5,2	
	KWS Baridor(B)	5,9	5,1	6,0	1,0			3,0		6,0	3,0		4,5	3,9	5,0	4,5	
	SU Erling(B)	6,0	5,3	7,5	1,0			2,5		5,0	2,0		4,5	3,8	5,1	4,5	
	SU Fred		5,2	7,0	1,0			3,0		5,0	2,0		3,5	3,6		4,4	
	SU Fenn			7,0	1,0			3,0		4,0	1,0		2,0	3,0			
	Farmaleo			7,5	1,0			3,0		5,0	1,0		4,0	3,6			
	SU Bebop(B)*	5,6	4,8	5,0	1,0			3,0		5,0	1,0		7,0	3,7	4,8	4,3	
	Mittel			6,7	1,0			3,1		5,4	2,1		4,2				
Mittel (B)	6,1	5,3	6,5	1,0			3,2		5,8	2,5		4,7	3,9	5,2	4,6		
Grenzdiff.																	
Anzahl Orte		10	6	2026											8	24-26 24	25/26 14
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Petkus	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel	
mit Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	3,9	2,7	2,5	1,0	3,3	1,7	1,0		1,0	1,0		2,3	1,7	2,9	2,2	
	SU Karlsson(B)	3,7	1,8	3,5	1,0	2,5	1,0	1,0		1,0	1,0		2,0	1,6	2,5	1,7	
	KWS Emphor(B)	3,4	2,2	2,5	1,0	3,3	1,7	1,0		1,0	1,0		1,0	1,6	2,5	1,8	
	KWS Baridor(B)	3,5	2,2	2,5	1,0	3,0		1,0		1,0	1,0		1,3	1,5	2,6	1,8	
	SU Erling(B)	3,1	1,8	4,5	1,0	3,3	1,0	1,0		1,0	1,0		2,3	1,9	2,4	1,9	
	SU Fred		2,1	2,5	1,0	2,8	1,3	1,0		1,0	1,0		2,7	1,7		1,8	
	SU Fenn			3,5	1,0	2,0	1,0	1,0		1,0	1,0		2,0	1,6			
	Farmaleo			3,0	1,0	3,0	1,0	1,0		1,0	1,0		2,3	1,7			
	SU Bebop(B)*	2,9	2,3	3,0	1,0	3,0	1,0	1,0		1,0	1,0		2,7	1,7	2,4	2,0	
	Mittel			2,9	1,0	2,9		1,0		1,0	1,0		2,1				
Mittel (B)	3,4	2,2	3,1	1,0	3,1	1,3	1,0		1,0	1,0		1,9	1,7	2,5	1,9		
Grenzdiff.																	

Mittel (B) = Bezugsbasis
* = Populationssorte

LSV Winterroggen 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern,
KWS, Hybro Saatzucht, Saatzucht Steinach)

Rhynchosporium (1-9)

Anzahl Orte		2024 3	2025 2	2026											6	24-26 11	25/26 8
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Petkus	Sonnewalde	Mittel		Mittel	Mittel
ohne Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	2,0	2,5	2,5	2,0			3,5			3,0	4,5	3,5	3,2		2,7	3,0
	SU Karlsson(B)	2,5	2,5	2,0	1,0			3,5			5,0	4,5	5,5	3,6		3,1	3,3
	KWS Emphor(B)	2,2	2,5	2,5	1,5			3,5			4,0	4,5	6,0	3,7		3,0	3,4
	KWS Baridor(B)	2,0	2,3	3,5	1,0			3,0			3,0	3,0	5,0	3,1		2,6	2,9
	SU Erling(B)	2,0	2,8	3,0	1,5			3,5			5,0	4,0	6,0	3,8		3,1	3,6
	SU Fred		2,8	3,0	1,0			3,0			4,0	5,0	5,5	3,6			3,4
	SU Fenn			3,0	1,0			3,0			5,0	4,5	3,5	3,3			
	Farmaleo			3,0	1,5			3,5			5,0	4,5	6,0	3,9			
	SU Bebop(B)*	1,8	3,0	3,0	1,5			3,5			5,0	4,5	7,5	4,2		3,3	3,9
	Mittel			2,9	1,3			3,3			4,3	4,3	5,4				
	Mittel (B)	2,1	2,6	2,8	1,4			3,4			4,2	4,2	5,6	3,6		3,0	3,3
	Grenzdif.																
Anzahl Orte		4	4	2026											7	24-26 15	25/26 11
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Petkus	Sonnewalde	Mittel		Mittel	Mittel
mit Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	2,1	2,1	2,0	1,0		3,3	3,5			2,7	2,0	1,0	2,2		2,2	2,2
	SU Karlsson(B)	2,0	2,0	2,5	1,0		3,0	3,5			2,0	1,5	3,3	2,4		2,2	2,3
	KWS Emphor(B)	2,2	2,1	2,0	1,0		2,7	2,5			2,3	1,5	2,7	2,1		2,1	2,1
	KWS Baridor(B)	2,0	2,4	2,5	1,0			3,5			2,7	2,5	3,7	2,7		2,4	2,6
	SU Erling(B)	2,1	2,1	2,5	1,0		2,7	4,0			2,0	2,5	2,7	2,5		2,3	2,4
	SU Fred		2,1	3,5	1,0		3,0	4,0			3,0	2,0	2,7	2,7			2,5
	SU Fenn			2,5	1,0		2,7	3,5			2,3	2,0	1,0	2,1			
	Farmaleo			2,5	1,0		2,7	3,5			3,0	2,0	2,7	2,5			
	SU Bebop(B)*	1,9	2,2	2,5	1,0		3,3	3,5			2,0	2,5	2,7	2,5		2,3	2,4
	Mittel			2,5	1,0			3,5			2,4	2,1	2,5				
	Mittel (B)	2,1	2,2	2,3	1,0		3,0	3,4			2,3	2,1	2,7	2,4		2,2	2,3
	Grenzdif.																

Mittel (B) = Bezugsbasis
* = Populationssorte

LSV Winterroggen 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern,
KWS, Hybro Saatzucht, Saatzucht Steinach)

Mehltau (1-9)

Anzahl Orte		2024 2	2025 2	2026											2	24-26 6	25/26 4
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Petkus	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel	
ohne Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	1,0	1,3	5,0	1,0									3,0	1,8	2,1	
	SU Karlsson(B)	1,0	1,5	3,0	1,0									2,0	1,5	1,8	
	KWS Emphor(B)	1,0	1,5	4,0	1,0									2,5	1,7	2,0	
	KWS Baridor(B)	2,0	1,0	7,0	1,0									4,0	2,3	2,5	
	SU Erling(B)	1,0	1,3	3,0	1,0									2,0	1,4	1,6	
	SU Fred		2,0	3,5	1,0									2,3		2,1	
	SU Fenn			3,5	1,0									2,3			
	Farmaleo			4,0	1,0									2,5			
	SU Bebop(B)*	1,0	2,0	7,0	1,0									4,0	2,3	3,0	
	Mittel			4,4	1,0												
Mittel (B)	1,2	1,4	4,8	1,0									2,9	1,8	2,2		
Grenzdifff.																	
Anzahl Orte		2	2	2026											3	24-26 7	25/26 5
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Petkus	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel	
mit Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	1,0	1,0	4,5	1,0		1,0							2,2	1,5	1,7	
	SU Karlsson(B)	1,0	1,0	1,5	1,0		1,0							1,2	1,1	1,1	
	KWS Emphor(B)	1,0	1,0	5,5	1,0		1,0							2,5	1,6	1,9	
	KWS Baridor(B)	1,7	1,0	6,0	1,0									3,5	2,1	2,3	
	SU Erling(B)	1,0	1,0	4,5	1,0		1,0							2,2	1,5	1,7	
	SU Fred		1,3	3,5	1,0		1,3							1,9		1,7	
	SU Fenn			3,5	1,0		1,0							1,8			
	Farmaleo			4,5	1,0		1,3							2,3			
	SU Bebop(B)*	1,0	1,3	6,5	1,0		1,7							3,1	2,0	2,3	
	Mittel			4,0	1,0												
	Mittel (B)	1,1	1,0	4,8	1,0		1,1							2,4	1,6	1,8	
	Grenzdifff.																

Mittel (B) = Bezugsbasis
* = Populationssorte

LSV Winterroggen 2024 - 2026, Anbaugesbiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern,
KWS, Hybro Saatzucht, Saatzucht Steinach)

Hektolitergewicht kg

Anzahl Orte		2024 4	2025 4	2026											2	24-26 10	25/26 6
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Petkus	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel	
ohne Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	71,0	69,9							54,6		66,1		60,4	68,4	66,7	
	SU Karlsson(B)	72,8	70,7							56,3		64,6		60,5	69,5	67,3	
	KWS Emphor(B)	70,6	69,0							44,1		64,2		54,2	66,7	64,1	
	KWS Baridor(B)	71,1	69,6							50,8		65,7		58,3	67,9	65,8	
	SU Erling(B)	72,6	70,1							63,9		62,9		63,4	69,8	67,9	
	SU Fred		70,0							52,9		65,6		59,3		66,4	
	SU Fenn									56,6		63,7		60,2			
	Farmaleo									64,3		62,2		63,3			
	SU Bebop(B)*	72,5	69,5							58,9		67,1		63,0	69,4	67,3	
	Mittel									55,8		64,7					
	Mittel (B)	71,8	69,8							54,8		65,1		59,9	68,6	66,5	
Grenzdif.																	
Anzahl Orte		7	7	2026											3	24-26 17	25/26 10
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Petkus	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel	
mit Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	70,5	69,9						69,8	69,6		67,5		69,0	70,0	69,6	
	SU Karlsson(B)	72,1	70,7						71,0	71,1		69,7		70,6	71,3	70,7	
	KWS Emphor(B)	70,3	69,7						68,9	72,9		66,8		69,5	69,9	69,7	
	KWS Baridor(B)	70,3	70,2						69,9	61,7		67,8		66,5	69,6	69,1	
	SU Erling(B)	72,1	70,7						70,4	73,8		67,3		70,5	71,2	70,6	
	SU Fred		70,3						70,4	67,7		70,0		69,4		70,0	
	SU Fenn								72,3	74,1		69,8		72,1			
	Farmaleo								69,9	73,8		66,3		70,0			
	SU Bebop(B)*	71,9	71,3						70,6	42,3		69,2		60,7	69,7	68,1	
	Mittel								70,4	67,4		68,3					
	Mittel (B)	71,2	70,4						70,1	65,2		68,1		67,8	70,3	69,6	
Grenzdif.																	

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = Populationssorte

LSV Winterroggen 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern,
KWS, Hybro Saatzucht, Saatzucht Steinach)

Tausendkornmasse g

Anzahl Orte		2024 6	2025 7	2026											1	24-26 14	25/26 8
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Petkus	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel	
ohne Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	29,5	27,8									24,2		24,2	28,3	27,4	
	SU Karlsson(B)	28,8	26,7									20,1		20,1	27,1	25,8	
	KWS Emphor(B)	28,8	28,1									23,6		23,6	28,1	27,5	
	KWS Baridor(B)	30,6	29,7									25,5		25,5	29,8	29,1	
	SU Erling(B)	29,3	27,3									21,3		21,3	27,8	26,6	
	SU Fred		27,6									22,8		22,8		27,0	
	SU Fenn											21,5		21,5			
	Farmaleo											25,1		25,1			
	SU Bebop(B)*	30,5	28,5									27,1		27,1	29,3	28,3	
	Mittel											23,5					
	Mittel (B)	29,6	28,0									23,6		23,6	28,4	27,5	
Grenzdiff.																	
Anzahl Orte		8	8	2026											2	24-26 18	25/26 10
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Petkus	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel	
mit Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	32,3	31,4			32,3						28,5		30,4	31,7	31,2	
	SU Karlsson(B)	31,3	31,0			30,0						28,3		29,1	30,9	30,6	
	KWS Emphor(B)	31,8	31,8			31,5						27,6		29,5	31,5	31,3	
	KWS Baridor(B)	33,2	32,6			33,2						29,2		31,2	32,7	32,3	
	SU Erling(B)	32,0	31,3			30,6						26,9		28,8	31,4	30,8	
	SU Fred		30,9			31,5						28,5		30,0		30,8	
	SU Fenn					31,7						28,8		30,2			
	Farmaleo					33,3						29,5		31,4			
	SU Bebop(B)*	32,7	32,5			31,9						29,0		30,5	32,4	32,1	
	Mittel					31,9						28,5					
	Mittel (B)	32,2	31,8			31,6						28,3		29,9	31,8	31,4	
Grenzdiff.																	

Mittel (B) = Bezugsbasis
* = Populationssorte

LSV Winterroggen 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern,
KWS, Hybro Saatzeit, Saatzeit Steinach)

Datum des Ährenschiebens

Anzahl Orte		2024	2025	2026										
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Pekus	Sonnenwalde	Mittel
ohne Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	08.05.2024	10.05.2025	14.05.2026	06.05.2026			08.05.2026		23.05.2026	20.05.2026	15.05.2026	14.05.2026	14.05.2026
	SU Karlsson(B)	08.05.2024	09.05.2025	12.05.2026	06.05.2026			07.05.2026		21.05.2026	20.05.2026	14.05.2026	13.05.2026	13.05.2026
	KWS Emphor(B)	07.05.2024	09.05.2025	12.05.2026	04.05.2026			06.05.2026		20.05.2026	20.05.2026	12.05.2026	08.05.2026	11.05.2026
	KWS Baridor(B)	07.05.2024	10.05.2025	13.05.2026	05.05.2026			07.05.2026		21.05.2026	20.05.2026	13.05.2026	13.05.2026	13.05.2026
	SU Erling(B)	07.05.2024	09.05.2025	09.05.2026	04.05.2026			07.05.2026		21.05.2026	20.05.2026	13.05.2026	12.05.2026	12.05.2026
	SU Fred		10.05.2025	13.05.2026	06.05.2026			07.05.2026		20.05.2026	20.05.2026	14.05.2026	13.05.2026	13.05.2026
	SU Fenn			12.05.2026	07.05.2026			07.05.2026		21.05.2026	20.05.2026	14.05.2026	13.05.2026	13.05.2026
	Farmaleo			14.05.2026	05.05.2026			07.05.2026		21.05.2026	20.05.2026	14.05.2026	08.05.2026	12.05.2026
	SU Bebo(B)*	07.05.2024	09.05.2025	11.05.2026	05.05.2026			07.05.2026		19.05.2026	20.05.2026	13.05.2026	08.05.2026	11.05.2026
	Mittel			12.05.2026	05.05.2026			07.05.2026		20.05.2026	20.05.2026	13.05.2026	11.05.2026	
	Mittel (B)													
	Grenzdiff.													
Anzahl Orte				2026										
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Pekus	Sonnenwalde	Mittel
mit Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	08.05.2024	11.05.2025	14.05.2026	06.05.2026	16.05.2026	22.05.2026	10.05.2026		23.05.2026	20.05.2026	15.05.2026	14.05.2026	16.05.2026
	SU Karlsson(B)	08.05.2024	10.05.2025	13.05.2026	06.05.2026	14.05.2026	22.05.2026	08.05.2026		21.05.2026	20.05.2026	14.05.2026	13.05.2026	15.05.2026
	KWS Emphor(B)	07.05.2024	09.05.2025	14.05.2026	04.05.2026	15.05.2026	22.05.2026	10.05.2026		20.05.2026	20.05.2026	12.05.2026	08.05.2026	15.05.2026
	KWS Baridor(B)	07.05.2024	09.05.2025	14.05.2026	05.05.2026	15.05.2026	22.05.2026	08.05.2026		21.05.2026	20.05.2026	13.05.2026	13.05.2026	15.05.2026
	SU Erling(B)	07.05.2024	09.05.2025	13.05.2026	05.05.2026	14.05.2026	22.05.2026	08.05.2026		21.05.2026	20.05.2026	13.05.2026	12.05.2026	15.05.2026
	SU Fred		10.05.2025	14.05.2026	06.05.2026	14.05.2026	22.05.2026	10.05.2026		20.05.2026	20.05.2026	14.05.2026	13.05.2026	15.05.2026
	SU Fenn			16.05.2026	07.05.2026	15.05.2026	22.05.2026	10.05.2026		21.05.2026	20.05.2026	14.05.2026	13.05.2026	16.05.2026
	Farmaleo			15.05.2026	05.05.2026	15.05.2026	22.05.2026	10.05.2026		21.05.2026	20.05.2026	14.05.2026	08.05.2026	15.05.2026
	SU Bebo(B)*	07.05.2024	09.05.2025	14.05.2026	05.05.2026	15.05.2026	22.05.2026	08.05.2026		19.05.2026	20.05.2026	13.05.2026	08.05.2026	15.05.2026
	Mittel			14.05.2026	05.05.2026	14.05.2026	22.05.2026	09.05.2026		20.05.2026	20.05.2026	13.05.2026	11.05.2026	
	Mittel (B)													
	Grenzdiff.													

Mittel (B) = Bezugsbasis
* = Populationssorte

LSV Winterroggen 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern,
KWS, Hybro Saatzeit, Saatzeit Steinach)

Datum der Gelbreife

Anzahl Orte		2024	2025	2026										
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Pekus	Sonnenwalde	Mittel
ohne Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	07.07.2024	07.07.2025	03.07.2026	17.07.2026			01.07.2026		29.07.2026	13.07.2026	09.07.2026	02.07.2026	10.07.2026
	SU Karlsson(B)	06.07.2024	06.07.2025	02.07.2026	18.07.2026			01.07.2026		30.07.2026	13.07.2026	10.07.2026	01.07.2026	10.07.2026
	KWS Emphor(B)	06.07.2024	07.07.2025	02.07.2026	15.07.2026			01.07.2026		30.07.2026	13.07.2026	07.07.2026	29.06.2026	09.07.2026
	KWS Baridor(B)	07.07.2024	07.07.2025	01.07.2026	17.07.2026			01.07.2026		30.07.2026	13.07.2026	08.07.2026	30.06.2026	10.07.2026
	SU Erling(B)	06.07.2024	07.07.2025	09.07.2026	15.07.2026			03.07.2026		29.07.2026	13.07.2026	10.07.2026	02.07.2026	11.07.2026
	SU Fred		07.07.2025	02.07.2026	15.07.2026			01.07.2026		30.07.2026	13.07.2026	09.07.2026	01.07.2026	10.07.2026
	SU Fenn			06.07.2026	17.07.2026			03.07.2026		31.07.2026	13.07.2026	09.07.2026	01.07.2026	11.07.2026
	Farmaleo			10.07.2026	17.07.2026			03.07.2026		01.08.2026	13.07.2026	11.07.2026	01.07.2026	12.07.2026
	SU Bebo(B)*	07.07.2024	07.07.2025	02.07.2026	15.07.2026			03.07.2026		28.07.2026	13.07.2026	10.07.2026	01.07.2026	10.07.2026
	Mittel			04.07.2026	16.07.2026			01.07.2026		29.07.2026	13.07.2026	09.07.2026	30.06.2026	
	Mittel (B)													
	Grenzdiff.													
Anzahl Orte				2026										
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Pekus	Sonnenwalde	Mittel
mit Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	07.07.2024	07.07.2025	02.07.2026	17.07.2026	10.07.2026	20.07.2026	02.07.2026		29.07.2026	13.07.2026	09.07.2026	02.07.2026	11.07.2026
	SU Karlsson(B)	06.07.2024	07.07.2025	01.07.2026	18.07.2026	07.07.2026	20.07.2026	04.07.2026		30.07.2026	13.07.2026	10.07.2026	01.07.2026	11.07.2026
	KWS Emphor(B)	06.07.2024	07.07.2025	30.06.2026	15.07.2026	08.07.2026	20.07.2026	04.07.2026		30.07.2026	13.07.2026	07.07.2026	29.06.2026	10.07.2026
	KWS Baridor(B)	07.07.2024	07.07.2025	30.06.2026	17.07.2026	08.07.2026	20.07.2026	03.07.2026		30.07.2026	13.07.2026	08.07.2026	30.06.2026	11.07.2026
	SU Erling(B)	06.07.2024	07.07.2025	01.07.2026	15.07.2026	08.07.2026	20.07.2026	04.07.2026		29.07.2026	13.07.2026	10.07.2026	02.07.2026	11.07.2026
	SU Fred		07.07.2025	03.07.2026	15.07.2026	07.07.2026	20.07.2026	04.07.2026		30.07.2026	13.07.2026	09.07.2026	01.07.2026	11.07.2026
	SU Fenn			01.07.2026	17.07.2026	07.07.2026	20.07.2026	03.07.2026		31.07.2026	13.07.2026	09.07.2026	01.07.2026	11.07.2026
	Farmaleo			02.07.2026	17.07.2026	08.07.2026	20.07.2026	03.07.2026		01.08.2026	13.07.2026	11.07.2026	01.07.2026	11.07.2026
	SU Bebo(B)*	07.07.2024	08.07.2025	07.07.2026	15.07.2026	08.07.2026	20.07.2026	03.07.2026		28.07.2026	13.07.2026	10.07.2026	01.07.2026	11.07.2026
	Mittel			01.07.2026	16.07.2026	08.07.2026	20.07.2026	03.07.2026		29.07.2026	13.07.2026	09.07.2026	30.06.2026	
	Mittel (B)													
	Grenzdiff.													

Mittel (B) = Bezugsbasis
* = Populationsorte

LSV Winterroggen 2024 - 2026, Anbaubereich D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern,
KWS, Hybro Saatzeit, Saatzeit Steinach)

Datum der Ernte

Anzahl Orte		2024	2025	2026									
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Pekus	Sonnenwalde
ohne Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	26.07.2024	02.08.2025	29.07.2026	04.08.2026			15.07.2026		07.08.2026	06.08.2026	30.07.2026	05.08.2026
	SU Karlsson(B)	26.07.2024	02.08.2025	29.07.2026	04.08.2026			15.07.2026		07.08.2026	06.08.2026	30.07.2026	05.08.2026
	KWS Emphor(B)	26.07.2024	02.08.2025	29.07.2026	04.08.2026			15.07.2026		07.08.2026	06.08.2026	30.07.2026	05.08.2026
	KWS Baridor(B)	26.07.2024	02.08.2025	29.07.2026	04.08.2026			15.07.2026		07.08.2026	06.08.2026	30.07.2026	05.08.2026
	SU Erling(B)	26.07.2024	02.08.2025	29.07.2026	04.08.2026			15.07.2026		07.08.2026	06.08.2026	30.07.2026	05.08.2026
	SU Fred		02.08.2025	29.07.2026	04.08.2026			15.07.2026		07.08.2026	06.08.2026	30.07.2026	05.08.2026
	SU Fenn			29.07.2026	04.08.2026			15.07.2026		07.08.2026	06.08.2026	30.07.2026	05.08.2026
	Farmaleo			29.07.2026	04.08.2026			15.07.2026		07.08.2026	06.08.2026	30.07.2026	05.08.2026
	SU Bebo(B)*	26.07.2024	02.08.2025	29.07.2026	04.08.2026			15.07.2026		07.08.2026	06.08.2026	30.07.2026	05.08.2026
	Mittel			29.07.2026	04.08.2026			15.07.2026		07.08.2026	06.08.2026	30.07.2026	05.08.2026
	Mittel (B)												
	Grenzdiff.												
Anzahl Orte				2026									
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Bornhof	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kleptow	Kranepuhl	Pekus	Sonnenwalde
mit Fungizid/WR	KWS Tayo(B)	26.07.2024	03.08.2025	29.07.2026	04.08.2026		04.08.2026	15.07.2026		07.08.2026	06.08.2026	30.07.2026	05.08.2026
	SU Karlsson(B)	26.07.2024	03.08.2025	29.07.2026	04.08.2026		04.08.2026	15.07.2026		07.08.2026	06.08.2026	30.07.2026	05.08.2026
	KWS Emphor(B)	26.07.2024	03.08.2025	29.07.2026	04.08.2026		04.08.2026	15.07.2026		07.08.2026	06.08.2026	30.07.2026	05.08.2026
	KWS Baridor(B)	26.07.2024	03.08.2025	29.07.2026	04.08.2026		04.08.2026	15.07.2026		07.08.2026	06.08.2026	30.07.2026	05.08.2026
	SU Erling(B)	26.07.2024	03.08.2025	29.07.2026	04.08.2026		04.08.2026	15.07.2026		07.08.2026	06.08.2026	30.07.2026	05.08.2026
	SU Fred		03.08.2025	29.07.2026	04.08.2026		04.08.2026	15.07.2026		07.08.2026	06.08.2026	30.07.2026	05.08.2026
	SU Fenn			29.07.2026	04.08.2026		04.08.2026	15.07.2026		07.08.2026	06.08.2026	30.07.2026	05.08.2026
	Farmaleo			29.07.2026	04.08.2026		04.08.2026	15.07.2026		07.08.2026	06.08.2026	30.07.2026	05.08.2026
	SU Bebo(B)*	26.07.2024	03.08.2025	29.07.2026	04.08.2026		04.08.2026	15.07.2026		07.08.2026	06.08.2026	30.07.2026	05.08.2026
	Mittel			29.07.2026	04.08.2026		04.08.2026	15.07.2026		07.08.2026	06.08.2026	30.07.2026	05.08.2026
	Mittel (B)												
	Grenzdiff.												

Mittel (B) = Bezugsbasis
* = Populationsorte