

LSV Wintertriticale 2023 - 2025, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Sortenempfehlung 2025 / 2026

Lombardo ⁴⁾, Belcanto ¹⁾, Rivolt ²⁾, Tributo¹⁾, Lumaco ^{2) 3)}, Fantastico (vorläufig), Bicross ³⁾ (vorläufig)

1) Auch für den Anbau mit reduziertem Pflanzenschutzmitteleinsatz

2) Schwächen in der Winterfestigkeit beachten

3) Für den gezielten Anbau langstrohiger Sorten

4) Stärkere Krankheitsanfälligkeit beachten

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ

Anzahl Orte		2023 5	2024 5	2025							6	24-25 11	23-25 16
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Lombardo (B)	102	84	92	95		88	99	102	99	96	90	94
	Belcanto (B)	100	108	93	99		101	102	100	103	100	103	102
	Rivolt (B)	98	100	102	107		98	94	100	101	100	100	100
	Trias (B)	98	92	99	98		94	86	92	97	94	93	95
	Tributo (B)	106	113	105	104		113	111	108	104	107	110	109
	Stelvio		114	106	101		105	86	107	104	102	107	
	Fantastico		105	93	99		102	113	103	103	102	103	
	SU Hubertus		105	99	103		101	94	109	106	102	103	
	Lumaco (B)	95	104	110	98		107	109	97	97	103	103	101
	Bicross		104	97	100		103	120	101	103	104	104	
	Promiso			109	108		108	125	110	109	111		
	Trimobe			100	100		104	134	104	108	108		
	Mittel			102	101		101	107	103	103			
	Mittel (B)	82,2	75,4	78,6	87,3		86,0	71,8	77,5	77,7	79,8	77,8	79,2
Grenzdiff.													
Anzahl Orte		2023 6	2024 6	2025							6	24-25 12	23-25 18
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Lombardo (B)	101	99	98	100	100	102	106		99	101	100	100
	Belcanto (B)	100	101	91	96	105	96	107		103	100	100	100
	Rivolt (B)	100	102	108	107	105	94	97		100	102	102	101
	Trias (B)	102	99	106	105	91	103	89		98	99	99	100
	Tributo (B)	99	100	94	96	101	106	104		98	100	100	99
	Stelvio		100	104	94	100	101	87		103	98	99	
	Fantastico		105	101	98	103	100	106		103	102	103	
	SU Hubertus		103	101	99	101	100	96		104	100	102	
	Lumaco (B)	98	99	103	96	98	99	97		102	99	99	99
	Bicross		102	100	99	105	107	108		101	103	103	
	Promiso			110	107	103	109	114		109	108		
	Trimobe			97	107	108	110	106		112	107		
	Mittel			101	100	102	104	102		103			
	Mittel (B)	91,9	86,6	84,8	94,3	93,4	91,7	77,0		81,6	87,1	86,9	88,5
Grenzdiff.													

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2023 - 2025, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Anzahl Orte		2023 5	2024 5	2025							6	24-25 11	23-25 16
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnevalde	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Lombardo (B)	83,7	63,0	72,4	83,0		76,1	70,9	79,0	76,7	76,3	70,3	74,5
	Belcanto (B)	82,5	81,3	73,0	86,1		86,8	73,5	77,7	79,8	79,5	80,3	81,0
	Rivolt (B)	80,9	75,0	79,9	93,4		84,2	67,6	77,3	78,3	80,1	77,8	78,8
	Trias (B)	80,4	69,5	77,6	85,1		80,5	61,4	71,7	75,3	75,2	72,6	75,0
	Tributo (B)	87,3	85,3	82,1	90,4		96,9	79,4	83,8	81,0	85,6	85,5	86,0
	Stelvio		85,9	83,1	88,1		90,2	62,1	83,0	80,7	81,2	83,3	
	Fantastico		79,2	73,2	86,5		88,1	81,5	79,9	79,8	81,5	80,4	
	SU Hubertus		79,0	78,0	89,5		86,7	67,4	84,9	82,4	81,5	80,3	
	Lumaco (B)	78,3	78,1	86,4	85,7		91,7	78,2	75,6	75,0	82,1	80,3	79,7
	Bicross		78,5	76,2	87,0		88,4	86,0	78,3	80,1	82,7	80,8	
	Promiso			85,6	94,3		92,5	90,0	85,6	84,9	88,8		
	Trimobe			78,9	87,6		89,6	96,3	80,6	84,1	86,2		
	Mittel			79,8	88,1		87,1	77,0	79,8	79,8			
	Mittel (B)	82,2	75,4	78,6	87,3		86,0	71,8	77,5	77,7	79,8	77,8	79,2
	Grenzdif.			9,0	7,8		6,0	9,8	3,0	3,0			
Anzahl Orte		2023 6	2024 6	2025							6	24-25 12	23-25 18
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnevalde	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Lombardo (B)	92,5	85,6	82,9	94,0	93,6	93,4	81,3		81,0	87,7	86,6	88,6
	Belcanto (B)	92,1	87,6	77,5	90,5	97,7	88,5	82,7		84,3	86,9	87,2	88,9
	Rivolt (B)	91,8	88,3	91,5	100,9	98,2	86,4	74,9		81,4	88,9	88,6	89,7
	Trias (B)	94,0	85,9	89,7	99,3	85,1	94,1	68,7		80,1	86,2	86,0	88,7
	Tributo (B)	90,8	86,4	79,9	90,6	94,7	97,1	79,9		79,8	87,0	86,7	88,1
	Stelvio		87,0	88,3	88,6	93,0	92,8	66,9		84,0	85,6	86,3	
	Fantastico		91,0	85,8	92,7	96,3	91,8	81,3		83,7	88,6	89,8	
	SU Hubertus		89,2	85,3	93,5	94,7	92,1	73,8		85,2	87,4	88,3	
	Lumaco (B)	89,9	85,9	87,3	90,3	91,2	90,9	74,7		82,9	86,2	86,1	87,4
	Bicross		88,1	84,6	93,0	98,4	98,4	83,4		82,7	90,1	89,1	
	Promiso			93,1	100,4	96,7	100,4	87,6		88,6	94,5		
	Trimobe			82,4	100,5	101,2	100,5	81,5		91,7	93,0		
	Mittel			86,0	94,5	95,1	95,0	78,2		83,8			
	Mittel (B)	91,9	86,6	84,8	94,3	93,4	91,7	77,0		81,6	87,1	86,9	88,5
	Grenzdif.			9,0	7,8	2,8	6,0	9,8		3,0			

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2023 - 2025, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - Behandlungseffekt

Anzahl Orte	Sorte	2023	2024	2025								2024-	2023-
		5	5	5								10	15
Intensität		Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Behandlungseffekt (Stufe 2 - Stufe 1)	Lombardo (B)	7,6	26,3	10,5	10,9		17,3	10,4		4,4	10,7	18,5	14,9
	Belcanto (B)	8,1	9,2	4,5	4,4		1,6	9,2		4,5	4,8	7,0	7,4
	Rivolt (B)	8,7	17,2	11,7	7,5		2,2	7,2		3,1	6,3	11,8	10,7
	Trias (B)	13,5	20,5	12,2	14,2		13,6	7,2		4,8	10,4	15,4	14,8
	Tributo (B)	2,8	5,2	-2,2	0,2		0,2	0,4		-1,2	-0,5	2,4	2,5
	Stelvio		4,3	5,2	0,5		2,6	4,8		3,3	3,3	3,8	
	Fantastico		14,9	12,6	6,1		3,7	-0,2		4,0	5,2	10,1	
	SU Hubertus		13,6	7,3	4,0		5,4	6,3		2,9	5,2	9,4	
	Lumaco (B)	10,4	10,6	0,9	4,7		-0,8	-3,5		7,9	1,8	6,2	7,6
	Bicross		12,1	8,4	6,0		10,0	-2,7		2,6	4,9	8,5	
	Promiso			7,5	6,1		7,9	-2,4		3,7	4,6		
	Trimobe			3,5	12,9		10,9	-14,8		7,6	4,0		
	Mittel			6,2	6,5		7,9	1,2		4,0			
	Mittel (B)	8,5	14,8	6,3	7,0		5,7	5,2		3,9	5,6	10,2	9,6
	Grenzdiff.												

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2023 - 2025, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Ähren je m²

Anzahl Orte		2023	2024	2025								24-25	23-25
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Lombardo (B)	514	519	457	316		600			552	481	500	504
	Belcanto (B)	560	535	450	376		488			567	470	503	518
	Rivolt (B)	537	487	336	420		596			500	463	475	492
	Trias (B)	543	519	425	348		544			541	465	492	506
	Tributo (B)	492	500	325	384		500			504	428	464	472
	Stelvio		452	372	380		504			626	470	461	
	Fantastico		530	475	420		584			537	504	517	
	SU Hubertus		462	365	340		516			604	456	459	
	Lumaco (B)	558	562	390	356		732			548	506	534	541
	Bicross		439	422	356		536			563	469	454	
	Promiso			372	300		576			548	449		
	Trimobe			393	348		488			534	441		
	Mittel			399	362		556			552			
	Mittel (B)	534	520	397	367		577			535	469	495	505
	Grenzdiff.												
Anzahl Orte		2023	2024	2025								24-25	23-25
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Lombardo (B)	591	516	486	308	600	620			533	509	512	535
	Belcanto (B)	585	561	397	364	583	464			605	482	522	540
	Rivolt (B)	555	513	483	388	595	596			538	520	517	528
	Trias (B)	548	564	382	360	590	596			496	485	524	531
	Tributo (B)	528	514	343	352	585	516			516	462	488	500
	Stelvio		520	404	380	603	588			558	506	513	
	Fantastico		540	454	412	585	564			536	510	525	
	SU Hubertus		506	311	324	585	464			568	450	478	
	Lumaco (B)	578	564	465	376	610	564			558	515	539	550
	Bicross		512	346	404	605	656			546	511	512	
	Promiso			364	420	595	588			538	501		
	Trimobe			407	396	595	532			561	498		
	Mittel			398	374	594	565			546			
	Mittel (B)	564	539	426	358	594	559			541	496	517	531
	Grenzdiff.												

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2023 - 2025, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte		2023	2024	2025								24-25	23-25
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Lombardo (B)	115	116	114	110			98		117	109	113	114
	Belcanto (B)	123	119	119	122			98		117	114	117	119
	Rivolt (B)	125	117	119	123			95		118	114	115	118
	Trias (B)	121	114	117	120			90		110	109	112	115
	Tributo (B)	118	112	120	115			93		114	110	111	113
	Stelvio		119	117	115			90		115	109	115	
	Fantastico		105	107	104			83		105	99	103	
	SU Hubertus		113	125	120			88		118	113	113	
	Lumaco (B)	133	127	134	132			115		129	127	127	129
	Bicross		130	126	139			120		130	129	130	
	Promiso			119	121			110		123	118		
	Trimobe			129	134			123		136	130		
	Mittel			121	121			102		119			
	Mittel (B)	122	117	120	120			98		117	114	116	118
	Grenzdiff.												
Anzahl Orte		2023	2024	2025								24-25	23-25
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Lombardo (B)	116	114	120	115	120		103		115	115	114	115
	Belcanto (B)	118	117	118	122	130		108		116	119	118	118
	Rivolt (B)	120	113	114	121	120		102		116	115	114	116
	Trias (B)	115	110	112	118	105		92		112	108	109	111
	Tributo (B)	114	111	116	112	115		102		117	112	112	112
	Stelvio		115	116	114	120		98		114	112	114	
	Fantastico		102	106	100	110		98		106	104	103	
	SU Hubertus		111	118	118	100		92		114	108	110	
	Lumaco (B)	131	119	125	129	120		103		128	121	120	124
	Bicross		120	128	137	130		102		133	126	123	
	Promiso			117	124	115		97		122	115		
	Trimobe			127	133	125		103		135	125		
	Mittel			118	120	118		100		119			
	Mittel (B)	119	114	117	119	118		102		117	115	114	116
	Grenzdiff.												

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2023 - 2025, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Lager vor Ernte (1-9)

Anzahl Orte		2023	2024	2025								24-25	23-25
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	4	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Lombardo (B)	2,9	2,4	1,0	1,0		1,5			2,0	1,4	1,9	2,3
	Belcanto (B)	2,6	2,1	1,0	1,0		1,0			2,0	1,3	1,7	2,1
	Rivolt (B)	3,2	2,3	1,5	1,5		2,5			2,0	1,9	2,1	2,5
	Trias (B)	2,9	1,8	1,0	1,0		1,0			2,0	1,3	1,6	2,1
	Tributo (B)	3,0	1,6	1,0	1,5		1,0			3,0	1,6	1,6	2,2
	Stelvio		2,4	1,5	1,0		2,0			2,5	1,8	2,1	
	Fantastico		1,8	1,0	1,0		1,0			2,0	1,3	1,6	
	SU Hubertus		2,2	1,0	1,0		2,0			2,5	1,6	1,9	
	Lumaco (B)	4,1	2,7	1,0	1,0		2,0			3,0	1,8	2,3	3,0
	Bicross		2,7	1,0	1,5		2,0			3,0	1,9	2,3	
	Promiso			1,0	1,0		1,5			3,0	1,6		
	Trimobe			1,5	2,5		4,5			3,0	2,9		
	Mittel			1,1	1,3		1,9			2,5			
	Mittel (B)	3,1	2,2	1,1	1,2		1,5			2,3	1,5	1,9	2,4
	Grenzdiff.												
Anzahl Orte		2023	2024	2025								24-25	23-25
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	4	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Lombardo (B)	2,3	1,8	1,0	1,0		1,0			2,0	1,3	1,6	1,9
	Belcanto (B)	1,7	1,7	1,0	1,0		1,0			2,0	1,3	1,5	1,6
	Rivolt (B)	2,6	1,7	2,0	1,0		1,5			2,0	1,6	1,7	2,0
	Trias (B)	1,8	1,7	1,0	1,0		1,0			2,0	1,3	1,5	1,6
	Tributo (B)	2,2	1,7	1,0	1,0		1,0			2,0	1,3	1,5	1,8
	Stelvio		2,1	1,0	1,0		1,0			2,0	1,3	1,8	
	Fantastico		1,7	1,0	1,0		1,0			2,0	1,3	1,5	
	SU Hubertus		1,9	1,0	1,0		1,0			2,0	1,3	1,6	
	Lumaco (B)	3,2	1,8	1,5	1,0		1,5			2,7	1,7	1,8	2,4
	Bicross		1,9	1,0	1,0		1,5			3,0	1,6	1,8	
	Promiso			1,0	1,0		1,0			2,7	1,4		
	Trimobe			2,5	2,0		3,0			3,0	2,6		
	Mittel			1,3	1,1		1,3			2,3			
	Mittel (B)	2,3	1,7	1,3	1,0		1,2			2,1	1,4	1,6	1,9
	Grenzdiff.												

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2023 - 2025, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Halmknicken (1-9)

Anzahl Orte		2023 4	2024 3	2025								3	24-25 6	23-25 10
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde		Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Lombardo (B)	1,3	3,3	2,0	1,0		1,0					1,3	2,3	1,9
	Belcanto (B)	1,5	2,3	1,5	1,0		1,0					1,2	1,8	1,7
	Rivolt (B)	1,3	1,8	1,5	1,0		1,0					1,2	1,5	1,4
	Trias (B)	1,5	2,0	1,5	1,0		1,0					1,2	1,6	1,6
	Tributo (B)	1,9	2,7	2,0	1,0		1,0					1,3	2,0	2,0
	Stelvio		1,8	2,0	1,0		1,0					1,3	1,6	
	Fantastico		1,3	1,0	1,0		1,0					1,0	1,2	
	SU Hubertus		1,8	1,5	1,0		1,0					1,2	1,5	
	Lumaco (B)	1,3	1,0	1,5	1,0		1,0					1,2	1,1	1,2
	Bicross		1,5	1,0	1,0		1,0					1,0	1,3	
	Promiso			1,0	1,0		1,0					1,0		
	Trimobe			1,5	2,0		1,0					1,5		
	Mittel			1,5	1,1		1,0							
	Mittel (B)	1,4	2,2	1,7	1,0		1,0					1,2	1,7	1,6
	Grenzdiff.													
Anzahl Orte		2023 4	2024 3	2025								3	24-25 6	23-25 10
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde		Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Lombardo (B)	1,3	1,2	1,0	1,0		1,0					1,0	1,1	1,2
	Belcanto (B)	1,4	2,0	2,0	1,0		1,0					1,3	1,7	1,6
	Rivolt (B)	1,6	1,5	1,0	1,0		1,0					1,0	1,3	1,4
	Trias (B)	1,3	1,2	1,0	1,0		1,0					1,0	1,1	1,2
	Tributo (B)	1,4	2,2	1,5	1,0		1,0					1,2	1,7	1,6
	Stelvio		1,3	1,5	1,0		1,0					1,2	1,3	
	Fantastico		1,3	1,0	1,0		1,0					1,0	1,2	
	SU Hubertus		1,2	1,0	1,0		1,0					1,0	1,1	
	Lumaco (B)	1,1	1,3	1,0	1,0		1,0					1,0	1,2	1,2
	Bicross		1,3	1,5	1,0		1,0					1,2	1,3	
	Promiso			1,5	1,0		1,0					1,2		
	Trimobe			3,0	1,5		1,0					1,8		
	Mittel			1,4	1,0		1,0							
	Mittel (B)	1,4	1,6	1,3	1,0		1,0					1,1	1,3	1,3
	Grenzdiff.													

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2023 - 2025, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Zwiewuchs (1-9)

Anzahl Orte		2023	2024	2025								24-25	23-25
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Lombardo (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	2,0			1,3	1,2	1,1
	Belcanto (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	2,5			1,4	1,3	1,2
	Rivolt (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	3,5			1,6	1,4	1,3
	Trias (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	3,0			1,5	1,3	1,2
	Tributo (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	3,0			1,5	1,3	1,2
	Stelvio		1,0	1,0	1,0		1,0	4,0			1,8	1,5	
	Fantastico		1,0	1,0	1,0		1,0	2,5			1,4	1,3	
	SU Hubertus		1,0	1,0	1,0		1,0	3,5			1,6	1,4	
	Lumaco (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,5			1,1	1,1	1,1
	Bicross		1,0	1,0	1,0		1,0	1,5			1,1	1,1	
	Promiso			1,0	1,0		1,0	2,0			1,3		
	Trimobe			1,0	1,0		1,0	3,0			1,5		
	Mittel			1,0	1,0		1,0	2,6					
	Mittel (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	2,6			1,4	1,3	1,2
	Grenzdiff.												
Anzahl Orte		2023	2024	2025								24-25	23-25
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Lombardo (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	1,3			1,1	1,1	1,0
	Belcanto (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	2,0			1,3	1,2	1,1
	Rivolt (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	2,3			1,3	1,2	1,1
	Trias (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	2,7			1,4	1,3	1,2
	Tributo (B)	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	2,0			1,3	1,2	1,1
	Stelvio		1,0	1,0	1,0		1,0	2,7			1,4	1,3	
	Fantastico		1,0	1,0	1,0		1,0	1,3			1,1	1,1	
	SU Hubertus		1,0	1,0	1,0		1,0	2,0			1,3	1,2	
	Lumaco (B)	1,0	1,0	1,5	1,0		1,0	3,7			1,8	1,5	1,4
	Bicross		1,0	1,0	1,0		1,0	3,0			1,5	1,3	
	Promiso			1,0	1,0		1,0	3,3			1,6		
	Trimobe			1,0	1,0		1,0	4,0			1,8		
	Mittel			1,0	1,0		1,0	2,7					
	Mittel (B)	1,0	1,0	1,1	1,0		1,0	2,3			1,4	1,2	1,2
	Grenzdiff.												

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2023 - 2025, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Blattseptoria (1-9)

Anzahl Orte		2023 2	2024 2	2025							1	24-25 3	23-25 5
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Lombardo (B)	1,0	5,3							3,5	3,5	4,7	3,2
	Belcanto (B)	1,0	3,8							3,5	3,5	3,7	2,6
	Rivolt (B)	1,0	4,3							3,5	3,5	4,0	2,8
	Trias (B)	1,0	3,5							3,5	3,5	3,5	2,5
	Tributo (B)	1,5	3,3							3,0	3,0	3,2	2,5
	Stelvio		4,3							4,0	4,0	4,2	
	Fantastico		4,0							3,0	3,0	3,7	
	SU Hubertus		3,8							3,0	3,0	3,5	
	Lumaco (B)	1,3	3,5							2,5	2,5	3,2	2,4
	Bicross		2,8							3,0	3,0	2,8	
	Promiso									3,0	3,0		
	Trimobe									3,5	3,5		
	Mittel									3,3			
	Mittel (B)	1,1	3,9							3,3	3,3	3,7	2,7
Grenzdif.													
Anzahl Orte		2023 1	2024 3	2025							2	24-25 5	23-25 6
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Lombardo (B)	1,0	2,3			1,0				3,7	2,3	2,3	2,1
	Belcanto (B)	1,0	1,3			1,0				3,3	2,2	1,7	1,6
	Rivolt (B)	1,0	1,5			1,0				3,0	2,0	1,7	1,6
	Trias (B)	1,0	1,6			1,0				3,0	2,0	1,8	1,6
	Tributo (B)	1,0	1,8			1,0				3,3	2,2	2,0	1,8
	Stelvio		1,5			1,0				2,7	1,8	1,6	
	Fantastico		1,5			1,0				2,7	1,8	1,6	
	SU Hubertus		1,3			1,0				3,0	2,0	1,6	
	Lumaco (B)	1,0	1,7			1,3				2,3	1,8	1,7	1,6
	Bicross		1,3			1,7				2,7	2,2	1,7	
	Promiso					1,0				2,7	1,8		
	Trimobe					1,0				3,0	2,0		
	Mittel					1,1				2,9			
	Mittel (B)	1,0	1,7			1,1				3,1	2,1	1,9	1,7
Grenzdif.													

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2023 - 2025, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Braunrost (1-9)

Anzahl Orte		2023 4	2024 4	2025								24-25 9	23-25 13
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	5 Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Lombardo (B)	2,6	4,9	7,5	3,0		5,5	6,5		6,0	5,7	5,3	4,5
	Belcanto (B)	1,4	3,0	2,5	1,0		1,0	1,0		2,5	1,6	2,2	2,0
	Rivolt (B)	1,3	2,6	1,0	3,5		1,5	1,5		3,5	2,2	2,4	2,0
	Trias (B)	1,5	3,6	5,5	3,5		2,0	2,0		4,0	3,4	3,5	2,9
	Tributo (B)	1,3	2,9	1,0	1,5		1,0	1,0		2,5	1,4	2,1	1,8
	Stelvio		2,5	1,5	1,5		1,0	1,0		2,0	1,4	1,9	
	Fantastico		3,1	2,0	1,5		1,0	1,0		2,0	1,5	2,2	
	SU Hubertus		3,4	2,0	1,5		1,5	1,0		2,0	1,6	2,4	
	Lumaco (B)	1,3	2,6	2,5	1,5		1,0	2,5		2,5	2,0	2,3	2,0
	Bicross		1,8	1,5	1,0		1,0	1,0		2,5	1,4	1,6	
	Promiso			1,0	2,5		1,0	1,5		2,5	1,7		
	Trimobe			1,0	1,5		1,0	1,0		2,0	1,3		
	Mittel			2,1	2,0		1,4	1,6		2,8			
	Mittel (B)	1,5	3,3	3,3	2,3		2,0	2,4		3,5	2,7	3,0	2,5
Grenzdiff.													
Anzahl Orte		2023 4	2024 5	2025								24-25 10	23-25 14
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	5 Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Lombardo (B)	1,6	2,3	1,0	1,0		2,0	1,0		3,3	1,7	2,0	1,9
	Belcanto (B)	1,0	1,4	1,0	1,0		1,0	1,0		2,0	1,2	1,3	1,2
	Rivolt (B)	1,0	1,9	1,0	1,0		1,0	1,0		2,0	1,2	1,5	1,4
	Trias (B)	1,4	2,6	1,0	1,0		1,0	1,0		2,0	1,2	1,9	1,8
	Tributo (B)	1,1	2,5	1,0	1,0		1,0	1,0		2,3	1,3	1,9	1,7
	Stelvio		1,7	1,0	1,0		1,0	1,0		2,0	1,2	1,5	
	Fantastico		1,4	1,0	1,0		1,0	1,0		2,3	1,3	1,3	
	SU Hubertus		1,5	1,0	1,0		1,0	1,0		2,0	1,2	1,4	
	Lumaco (B)	1,0	1,6	1,0	1,0		1,0	1,0		2,0	1,2	1,4	1,3
	Bicross		1,5	1,0	1,5		1,0	1,0		2,0	1,3	1,4	
	Promiso			1,0	1,0		1,0	1,0		2,0	1,2		
	Trimobe			1,0	1,0		1,0	1,0		2,0	1,2		
	Mittel			1,0	1,0		1,1	1,0		2,2			
	Mittel (B)	1,2	2,0	1,0	1,0		1,2	1,0		2,3	1,3	1,7	1,5
Grenzdiff.													

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2023 - 2025, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Gelbrost (1-9)

Anzahl Orte	Intensität	Sorte	2023	2024	2025							24-25	23-25
			Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
ohne Fungizid		Lombardo (B)	1,0	5,0		1,0						1,0	3,7
		Belcanto (B)	1,0	1,5		1,5						1,5	1,3
		Rivolt (B)	1,3	1,8		1,0						1,0	1,4
		Trias (B)	1,3	1,3		1,0						1,0	1,2
		Tributo (B)	1,0	1,5		1,0						1,0	1,2
		Stelvio		1,0		1,0						1,0	
		Fantastico		3,0		1,0						1,0	
		SU Hubertus		3,0		1,0						1,0	
		Lumaco (B)	1,0	1,0		1,0						1,0	1,0
		Bicross		1,0		1,0						1,0	
		Promiso				1,0						1,0	
		Trimobe				1,0						1,0	
		Mittel				1,0							
		Mittel (B)	1,1	2,0		1,1						1,1	1,5
		Grenzdiff.											
Anzahl Orte	Intensität	Sorte	2023	2024	2025							24-25	23-25
			Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
mit Fungizid		Lombardo (B)	1,0	1,3		1,0						1,0	1,1
		Belcanto (B)	1,0	1,1		1,0						1,0	1,1
		Rivolt (B)	1,0	1,1		1,0						1,0	1,1
		Trias (B)	1,0	1,2		1,0						1,0	1,1
		Tributo (B)	1,0	1,2		1,0						1,0	1,1
		Stelvio		1,2		1,0						1,0	
		Fantastico		1,2		1,0						1,0	
		SU Hubertus		1,1		1,0						1,0	
		Lumaco (B)	1,0	1,1		1,0						1,0	1,1
		Bicross		1,3		1,0						1,0	1,3
		Promiso				1,0						1,0	
		Trimobe				1,0						1,0	
		Mittel				1,0							
		Mittel (B)	1,0	1,2		1,0						1,0	1,1
		Grenzdiff.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2023 - 2025, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Mehltau (1-9)

Intensität	Anzahl Orte	Sorte	2023	2024	2025							5	24-25	23-25
			6	5	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	10	16
ohne Fungizid	Lombardo (B)	3,5	2,5	1,0	1,5		5,0	3,5		3,5	2,9	2,7	3,0	
	Belcanto (B)	3,3	3,1	3,0	3,5		5,5	1,0		4,0	3,4	3,3	3,3	
	Rivolt (B)	4,7	4,4	6,0	3,5		7,5	4,0		4,5	5,1	4,8	4,7	
	Trias (B)	5,4	3,3	1,5	4,0		8,0	7,0		5,5	5,2	4,3	4,7	
	Tributo (B)	2,0	2,0	1,5	1,5		2,0	1,0		2,5	1,7	1,9	1,9	
	Stelvio		2,9	4,0	2,5		3,5	2,0		3,5	3,1	3,0		
	Fantastico		3,9	5,5	2,5		6,5	2,5		4,0	4,2	4,1		
	SU Hubertus		2,9	3,0	1,0		4,5	1,0		3,0	2,5	2,7		
	Lumaco (B)	1,7	2,6	2,5	2,0		6,5	2,0		4,0	3,4	3,0	2,5	
	Bicross		3,9	3,0	2,5		6,5	4,5		4,0	4,1	4,0		
	Promiso			1,0	1,5		2,5	1,0		3,0	1,8			
	Trimobe			1,0	1,5		2,5	1,5		3,0	1,9			
	Mittel			2,7	2,3		5,0	2,6		3,7				
	Mittel (B)	3,4	3,0	2,6	2,7		5,8	3,1		4,0	3,6	3,3	3,3	
Grenzdif.														
Intensität	Anzahl Orte	Sorte	2023	2024	2025							6	24-25	23-25
			6	6	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	12	18
mit Fungizid	Lombardo (B)	1,8	1,9	1,0	1,0	1,0	5,5	1,0		3,7	2,2	2,1	2,0	
	Belcanto (B)	1,8	2,1	1,0	1,0	1,0	4,5	1,0		4,7	2,2	2,1	2,0	
	Rivolt (B)	1,7	3,6	1,0	1,0	3,0	6,0	2,0		4,7	2,9	3,3	2,7	
	Trias (B)	2,1	3,0	1,0	1,0	3,0	7,5	1,7		6,0	3,4	3,2	2,8	
	Tributo (B)	1,5	1,2	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0		3,0	1,4	1,3	1,4	
	Stelvio		2,6	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0		3,7	1,7	2,1		
	Fantastico		2,5	1,0	1,5	2,0	6,0	1,0		4,0	2,6	2,5		
	SU Hubertus		2,1	1,0	1,0	1,0	4,5	1,0		3,0	1,9	2,0		
	Lumaco (B)	1,5	2,1	1,0	1,5	1,0	7,0	1,0		4,0	2,6	2,3	2,0	
	Bicross		2,5	1,0	1,0	3,0	4,5	1,0		4,0	2,4	2,5		
	Promiso			1,0	1,0	1,0	1,5	1,0		3,0	1,4			
	Trimobe			1,0	1,0	1,0	1,5	1,0		3,0	1,4			
	Mittel			1,0	1,1	1,6	4,0	1,2		3,9				
	Mittel (B)	1,7	2,3	1,0	1,1	1,7	5,3	1,3		4,3	2,4	2,4	2,2	
Grenzdif.														

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2023 - 2025, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Rhynchosporium (1-9)

Anzahl Orte		2023	2024	2025								24-25	23-25
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Lombardo (B)	2,5	3,0	2,5	2,0		3,0				2,5	2,8	2,7
	Belcanto (B)	2,3	2,3	2,0	1,5		2,0				1,8	2,1	2,1
	Rivolt (B)	3,5	3,3	2,0	2,5		2,5				2,3	2,9	3,0
	Trias (B)	3,0	3,5	2,5	3,0		3,0				2,8	3,2	3,2
	Tributo (B)	2,0	1,8	2,0	1,5		3,0				2,2	1,9	1,9
	Stelvio		2,1	2,0	2,0		2,5				2,2	2,1	
	Fantastico		2,1	1,5	2,0		3,5				2,3	2,2	
	SU Hubertus		2,5	1,5	1,5		2,5				1,8	2,2	
	Lumaco (B)	2,3	3,3	2,0	2,0		4,0				2,7	3,0	2,8
	Bicross		2,9	1,5	2,0		2,5				2,0	2,5	
	Promiso			1,0	2,5		2,0				1,8		
	Trimobe			3,0	1,5		2,0				2,2		
	Mittel			1,9	2,0		2,6						
	Mittel (B)	2,6	2,8	2,2	2,1		2,9				2,4	2,6	2,6
	Grenzdiff.												
Anzahl Orte		2023	2024	2025								24-25	23-25
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Lombardo (B)	2,4	2,3	1,0	1,0		2,5				1,5	2,0	2,1
	Belcanto (B)	1,9	1,9	1,0	1,0		2,0				1,3	1,7	1,7
	Rivolt (B)	1,9	2,4	1,0	1,0		2,5				1,5	2,1	2,0
	Trias (B)	1,7	2,4	1,0	1,0		3,0				1,7	2,1	2,0
	Tributo (B)	1,7	1,7	1,0	1,5		2,0				1,5	1,6	1,7
	Stelvio		2,3	1,0	1,0		2,0				1,3	1,9	
	Fantastico		1,7	1,0	1,5		3,0				1,8	1,8	
	SU Hubertus		2,2	1,0	1,0		3,0				1,7	2,0	
	Lumaco (B)	1,7	2,6	1,0	1,5		2,5				1,7	2,3	2,1
	Bicross		1,9	1,0	1,5		2,5				1,7	1,8	
	Promiso			1,0	1,0		3,0				1,7		
	Trimobe			1,0	1,0		2,0				1,3		
	Mittel			1,0	1,2		2,5						
	Mittel (B)	1,9	2,2	1,0	1,2		2,4				1,5	2,0	1,9
	Grenzdiff.												

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2023 - 2025, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Tausendkornmasse bei 86% TS (g)

Anzahl Orte		2023 4	2024 4	2025							1	24-25 5	23-25 9
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Lombardo (B)	44,8	36,6				43,3				43,3	37,9	41,0
	Belcanto (B)	44,0	44,4				45,9				45,9	44,7	44,4
	Rivolt (B)	40,0	38,9				47,0				47,0	40,5	40,3
	Trias (B)	41,9	35,4				41,0				41,0	36,5	38,9
	Tributo (B)	49,4	49,2				48,1				48,1	49,0	49,2
	Stelvio		51,0				53,2				53,2	51,4	
	Fantastico		38,0				48,0				48,0	40,0	
	SU Hubertus		43,5				53,8				53,8	45,5	
	Lumaco (B)	39,5	39,2				48,8				48,8	41,1	40,4
	Bicross		42,4				49,7				49,7	43,9	
	Promiso						48,1				48,1		
	Trimobe						48,0				48,0		
	Mittel						47,9						
	Mittel (B)	43,3	40,6				45,7				45,7	41,6	42,3
	Grenzdif.												
Anzahl Orte		2023 5	2024 5	2025							1	24-25 6	23-25 11
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Lombardo (B)	46,0	44,3				48,8				48,8	45,1	45,5
	Belcanto (B)	46,2	47,1				42,8				42,8	46,4	46,3
	Rivolt (B)	42,3	42,8				47,5				47,5	43,6	43,0
	Trias (B)	42,7	41,6				45,8				45,8	42,3	42,5
	Tributo (B)	49,6	51,7				42,7				42,7	50,2	49,9
	Stelvio		52,3				48,4				48,4	51,6	
	Fantastico		43,8				45,5				45,5	44,1	
	SU Hubertus		47,5				51,8				51,8	48,2	
	Lumaco (B)	40,0	41,5				50,5				50,5	43,0	41,6
	Bicross		44,7				49,7				49,7	45,5	
	Promiso						48,3				48,3		
	Trimobe						42,1				42,1		
	Mittel						47,2						
	Mittel (B)	44,5	44,8				46,3				46,3	45,1	44,8
	Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2023 - 2025, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Datum des Ährenschiebens

Anzahl Orte		2023 6	2024 5	2025								5	24-25 10	23-25 16
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel	
ohne Fungizid	Lombardo (B)	20.5	12.5	15.5	9.5		8.5	16.5		16.5	12.5	12.5	15.5	
	Belcanto (B)	22.5	12.5	20.5	11.5		8.5	16.5		19.5	14.5	13.5	16.5	
	Rivolt (B)	18.5	10.5	9.5	7.5		5.5	12.5		13.5	9.5	9.5	12.5	
	Trias (B)	18.5	11.5	12.5	9.5		8.5	15.5		13.5	11.5	11.5	14.5	
	Tributo (B)	23.5	15.5	26.5	11.5		7.5	21.5		22.5	17.5	16.5	19.5	
	Stelvio		12.5	15.5	10.5		9.5	15.5		16.5	13.5	12.5		
	Fantastico		12.5	18.5	10.5		10.5	15.5		18.5	14.5	13.5		
	SU Hubertus		10.5	13.5	8.5		8.5	13.5		13.5	11.5	10.5		
	Lumaco (B)	18.5	10.5	10.5	9.5		5.5	12.5		12.5	9.5	9.5	12.5	
	Bicross		9.5	8.5	2.5		4.5	9.5		12.5	7.5	8.5		
	Promiso			11.5	9.5		7.5	12.5		12.5	10.5			
	Trimobe			11.5	9.5		6.5	13.5		12.5	10.5			
	Mittel			13.5	8.5		6.5	13.5		14.5				
	Mittel (B)	19.5	11.5	15.5	9.5		6.5	15.5		15.5	12.5	12.5	15.5	
Grenzdiff.														
Anzahl Orte		2023 7	2024 6	2025								6	24-25 12	23-25 19
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel	
mit Fungizid	Lombardo (B)	20.5	11.5	16.5	9.5	15.5	14.5	16.5		16.5	14.5	13.5	15.5	
	Belcanto (B)	22.5	11.5	21.5	11.5	20.5	15.5	16.5		19.5	17.5	14.5	17.5	
	Rivolt (B)	18.5	9.5	10.5	7.5	15.5	6.5	12.5		13.5	10.5	10.5	13.5	
	Trias (B)	18.5	10.5	12.5	9.5	18.5	10.5	15.5		13.5	12.5	11.5	14.5	
	Tributo (B)	23.5	15.5	27.5	11.5	25.5	18.5	21.5		22.5	20.5	17.5	20.5	
	Stelvio		11.5	16.5	10.5	15.5	11.5	15.5		16.5	13.5	12.5		
	Fantastico		11.5	18.5	10.5	18.5	15.5	15.5		18.5	15.5	13.5		
	SU Hubertus		9.5	13.5	8.5	17.5	12.5	13.5		13.5	12.5	11.5		
	Lumaco (B)	17.5	9.5	11.5	9.5	15.5	6.5	12.5		12.5	10.5	10.5	13.5	
	Bicross		8.5	8.5	2.5	15.5	5.5	9.5		12.5	8.5	8.5		
	Promiso			11.5	9.5	15.5	16.5	12.5		12.5	12.5			
	Trimobe			13.5	9.5	15.5	9.5	13.5		12.5	11.5			
	Mittel			14.5	8.5	16.5	10.5	13.5		14.5				
	Mittel (B)	19.5	10.5	16.5	9.5	18.5	11.5	15.5		15.5	13.5	12.5	15.5	
Grenzdiff.														

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2023 - 2025, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Datum der Gelbreife

Anzahl Orte		2023 6	2024 5	2025							5	24-25 10	23-25 16
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Lombardo (B)	10.7	3.7	30.6	3.7		30.6	11.7		4.7	3.7	3.7	6.7
	Belcanto (B)	12.7	6.7	4.7	3.7		5.7	14.7		4.7	6.7	6.7	8.7
	Rivolt (B)	7.7	2.7	1.7	30.6		30.6	9.7		1.7	2.7	2.7	4.7
	Trias (B)	9.7	4.7	4.7	2.7		2.7	7.7		2.7	3.7	4.7	6.7
	Tributo (B)	11.7	6.7	6.7	1.7		4.7	18.7		4.7	6.7	6.7	8.7
	Stelvio		5.7	5.7	1.7		3.7	9.7		4.7	4.7	5.7	
	Fantastico		3.7	2.7	3.7		1.7	11.7		4.7	4.7	3.7	
	SU Hubertus		4.7	1.7	1.7		3.7	9.7		2.7	3.7	3.7	
	Lumaco (B)	9.7	2.7	1.7	2.7		3.7	7.7		1.7	2.7	2.7	5.7
	Bicross		3.7	3.7	30.6		30.6	7.7		1.7	2.7	2.7	
	Promiso			30.6	2.7		30.6	7.7		1.7	2.7		
	Trimobe			4.7	30.6		2.7	14.7		1.7	4.7		
	Mittel			2.7	1.7		2.7	9.7		2.7			
	Mittel (B)	9.7	3.7	2.7	1.7		2.7	11.7		2.7	3.7	4.7	6.7
Grenzdiff.													
Anzahl Orte		2023 7	2024 6	2025							6	24-25 12	23-25 19
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Lombardo (B)	10.7	3.7	1.7	3.7	7.7	4.7	11.7		4.7	5.7	4.7	6.7
	Belcanto (B)	12.7	5.7	7.7	3.7	7.7	5.7	14.7		4.7	6.7	6.7	8.7
	Rivolt (B)	8.7	2.7	6.7	30.6	1.7	3.7	9.7		1.7	3.7	3.7	5.7
	Trias (B)	9.7	3.7	7.7	2.7	1.7	3.7	7.7		2.7	3.7	3.7	5.7
	Tributo (B)	13.7	5.7	8.7	1.7	7.7	5.7	18.7		4.7	7.7	6.7	8.7
	Stelvio		5.7	5.7	1.7	1.7	3.7	9.7		4.7	3.7	4.7	
	Fantastico		3.7	5.7	3.7	7.7	3.7	11.7		4.7	5.7	4.7	
	SU Hubertus		3.7	6.7	1.7	7.7	5.7	9.7		2.7	5.7	4.7	
	Lumaco (B)	9.7	2.7	6.7	2.7	7.7	2.7	7.7		1.7	4.7	3.7	5.7
	Bicross		3.7	6.7	30.6	1.7	3.7	7.7		1.7	3.7	3.7	
	Promiso			5.7	2.7	1.7	3.7	7.7		1.7	3.7		
	Trimobe			7.7	30.6	7.7	3.7	14.7		1.7	5.7		
	Mittel			5.7	1.7	4.7	3.7	9.7		2.7			
	Mittel (B)	10.7	3.7	5.7	1.7	5.7	3.7	11.7		2.7	4.7	4.7	6.7
Grenzdiff.													

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2023 - 2025, Anbaugebiet D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LFULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Datum der Ernte

Intensität	Anzahl Orte	2023 5	2024 5	2025								24-25 10	23-25 15
	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Lombardo (B)	29.7	22.7	2.8	24.7			20.7	30.7	7.8	29.7	25.7	26.7
	Belcanto (B)	29.7	22.7	2.8	24.7			20.7	30.7	7.8	29.7	25.7	26.7
	Rivolt (B)	29.7	22.7	2.8	24.7			20.7	30.7	7.8	29.7	25.7	26.7
	Trias (B)	29.7	22.7	2.8	24.7			20.7	30.7	7.8	29.7	25.7	26.7
	Tributo (B)	29.7	22.7	2.8	24.7			20.7	30.7	7.8	29.7	25.7	26.7
	Stelvio		22.7	2.8	24.7			20.7	30.7	7.8	29.7	25.7	
	Fantastico		22.7	2.8	24.7			20.7	30.7	7.8	29.7	25.7	
	SU Hubertus		22.7	2.8	24.7			20.7	30.7	7.8	29.7	25.7	
	Lumaco (B)	29.7	22.7	2.8	24.7			20.7	30.7	7.8	29.7	25.7	26.7
	Bicross		22.7	2.8	24.7			20.7	30.7	7.8	29.7	25.7	
	Promiso			2.8	24.7			20.7	30.7	7.8	29.7		
	Trimobe			2.8	24.7			20.7	30.7	7.8	29.7		
	Mittel			2.8	24.7			20.7	30.7	7.8			
	Mittel (B)	29.7	22.7	2.8	24.7			20.7	30.7	7.8	29.7	25.7	26.7
	Grenzdiff.												
Intensität	Anzahl Orte	2023 6	2024 6	2025								24-25 12	23-25 18
	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Lombardo (B)	1.8	23.7	2.8	24.7	11.8		20.7	30.7	7.8	31.7	27.7	28.7
	Belcanto (B)	1.8	23.7	2.8	24.7	11.8		20.7	30.7	7.8	31.7	27.7	28.7
	Rivolt (B)	1.8	23.7	2.8	24.7	11.8		20.7	30.7	7.8	31.7	27.7	28.7
	Trias (B)	1.8	23.7	2.8	24.7	11.8		20.7	30.7	7.8	31.7	27.7	28.7
	Tributo (B)	1.8	23.7	2.8	24.7	11.8		20.7	30.7	7.8	31.7	27.7	28.7
	Stelvio		23.7	2.8	24.7	11.8		20.7	30.7	7.8	31.7	27.7	
	Fantastico		23.7	2.8	24.7	11.8		20.7	30.7	7.8	31.7	27.7	
	SU Hubertus		23.7	2.8	24.7	11.8		20.7	30.7	7.8	31.7	27.7	
	Lumaco (B)	1.8	23.7	2.8	24.7	11.8		20.7	30.7	7.8	31.7	27.7	28.7
	Bicross		23.7	2.8	24.7	11.8		20.7	30.7	7.8	31.7	27.7	
	Promiso			2.8	24.7	11.8		20.7	30.7	7.8	31.7		
	Trimobe			2.8	24.7	11.8		20.7	30.7	7.8	31.7		
	Mittel			2.8	24.7	11.8		20.7	30.7	7.8			
	Mittel (B)	1.8	23.7	2.8	24.7	11.8		20.7	30.7	7.8	31.7	27.7	28.7
	Grenzdiff.												

Mittel (B) = Bezugsbasis